

人工藥物性流產須知

一、藥物流產使用須知：

- (1) 經由醫師執行超音波及 β -HCG 檢測後確定懷孕，才可使用。
- (2) 在你未服用藥物之前，你都可以隨時選擇藥物流產或人工流產手術。
- (3) 使用 Apano 的禁忌症？使用藥物前一定要告知醫師：
 1. 慢性腎上腺衰竭或功能不全者。
 2. 對 Apano 過敏者。
 3. 長期併用類固醇類治療。
 4. 出血性疾病或併用抗凝血劑治療。
 5. 尚未經由超音波掃描或生化測驗確認的懷孕。
 6. 妊娠日數超過 49 天。
 7. 疑似子宮外孕。
 8. 對前列腺素藥物過敏者。
 9. 35 歲以上婦女且一天抽菸超過 10 支以上。
 10. 遺傳性紫質沉著病。
- (4) 可能發生副作用：
 1. 在使用前列腺素藥物後幾小時之內，會有子宮收縮或痙攣的現象 (10~15%)。
 2. 在使用前列腺素藥物後出現噁心、嘔吐、下痢等症狀。
 3. 隨著懷孕天數的增加，其出血也跟著增加而延長。
 4. 少數有低血壓現象。
 5. 少數有皮膚過敏反應。
 6. 偶頭暈、熱潮紅、寒冷。
- (5) 藥物流產的成功率為 95%。
- (6) 告知使用 Apano 失敗的話，若繼續懷孕，胎兒有畸型的危險性。
- (7) 若子宮內裝有避孕器發生懷孕時，在給予 Apano 前需先移除。
- (8) 最近使用消炎藥或其他藥物，應事先告知醫師，以免發生藥物交互作用。
- (9) 要遵照醫師指示確實回診追蹤檢查，確認胚胎是否完全排出。

二、藥物流產使用流程：

- (1) 醫師為合格的「優生保健」醫師，依法才可施行藥物流產手術。
- (2) 患者應拿到一份患者同意書，須仔細閱讀治療內容，若有任何問題應與醫護人員溝通討論，確認完全了解後在「患者同意書」上簽名。
- (3) 已婚者一定要請先生陪同前來，先生須出示「身份證」證明並簽名蓋章同意才行，若未能親自陪同時，恕不受理，敬請見諒。
- (4) 未成年(未滿 20 歲者)須家長(或監護人)，攜帶「身分證」親自出面簽名蓋章同意才行，否則恕不受理。

流程:

- 在服用 Apano 之前患者必須閱讀及簽署「患者同意書」。
- 一次口服 Apano 200mg 錠劑 3 顆，一次服完。
- 在服用 Apano 36~48 小時之後回診，回診口服前列腺素藥物後即可回家，若有不適，必要時留院觀察。
- 在服用 Apano 後一~二週內，患者必須回診追蹤，經臨床檢查、 β -HCG 測定、超音波掃描等來確定胚胎是否完全排出。

三、藥物流產後須知：

(1) 第一次服藥後，有的人會有少量陰道出血，第二次服藥，完成藥物流產（為流產日）少數人少量出血可持續長達 10~14 天，仍是正常現象。

(2) 第二次服藥後一週內務必返院檢查，若有特殊狀況，以便醫師做進一步的抽血檢查或超音波追蹤。

(3) 服藥期間後一週內禁止房事及陰道沖洗，儘量避免粗重的工作；正常作息，不必完全臥床休息。

(4) 若有下列情形，須迅速返院檢查或掛急診：

嚴重下腹痛，且越來越厲害

陰道大量出血

腹脹、嘔吐不止

發燒、白帶增多

不明原因暈倒

(5) 下次月經在流產日後 30~37 天才會來，這段期間仍需避孕，可暫時先採用保險套或避孕藥。

(6) 若想裝置避孕器，可再下次月經來潮乾淨時裝置。

~ 中山醫學大學附設醫院 婦產部 關心您 ~

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡

婦產科諮詢室：(04)24739595 分機 32204