





Sulfonylureas 類

★刺激胰臟分泌較多的胰島素★建議飯前 30 分鐘服用

★可能之副作用：低血糖、腸胃不適

商品名	Diamicon 岱蜜克龍	Glipizide 泌得贊	Amaryl M 美爾胰(複方)	GlucOMET 克糖美(複方)
成分、含量	Gliclazide 30mg	Glipizide 5mg	Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg	Glyburide 5mg/ Metformin 500mg
外觀				

Meglitinides 類

★刺激胰臟分泌較多的胰島素

★建議隨餐服用



★可能之副作用：低血糖、腸胃不適

Biguanide 類

★抑制肝臟製造葡萄糖

★建議飯後服用



★可能之副作用：腸胃不適、噁心、嘔吐

商品名	Repaglinide 柔糖	Glucophage 庫魯化
成分、含量	Repaglinide 1mg	Metformin 500mg
外觀		

Thalidinediones 類

★增加體內對胰島素的敏感性★建議飯前或飯後服用





★可能之不良反應：體重增加、水腫、頭痛

商品名	Actos 愛妥糖	ActosMet 愛妥蜜(複方)
成分、含量	Pioglitazone 15mg	Pioglitazone 15mg/Metformin 850mg
外觀		

DPP4 抑制劑類

★提高血液循環中生理活性之腸泌素，從而增加胰島素分泌★建議飯前或飯後服用服用




★可能之副作用：低血糖、頭痛、暈眩、噁心、過敏、腹瀉

商品名	Januvia 佳糖維	Nesina 耐釋糖	Galvus 高糖優適	Trajenta 糖漸平
成分、含量	Sitagliptin 100mg	Alogliptin 25mg	Vildagliptin 50mg	Linagliptin 5mg
外觀				







SGLT2 抑制劑類

★降低腎臟對糖分再吸收作用，增加糖尿病人尿液中的排糖量

商品名	Forxiga 福適佳	JARDiance 恩排糖	Canaglu 可拿糖
成分、含量	Dapagliflozin 10mg	Empagliflozin 25mg	Canagliflozin 100mg
外觀			
建議服用時間	隨餐或空腹	飯前或飯後	隨餐或空腹
可能副作用	黴菌感染、鼻咽炎、噁心	血脂異常、尿路感染、暈眩噁心	泌尿道感染、低血糖、脫水、便秘




DPP4、SGLT2 複方藥品類

★作用及可能之副作用均請參考以上表格★建議依醫囑指示服用

商品名	Xigduo 釋多糖	Glyxambi 糖順平	Jardiance Duo 恩美糖	Oseni 歐欣尼
成分、含量	Dapagliflozin 10mg/ Metformin 1000mg	Linagliptin 5mg/ Empagliflozin 25mg	Empagliflozin 12.5 mg / Metformin 850mg	Alogliptin 25mg / pioglitazone 30 mg
外觀				

DPP4、SGLT2 複方藥品類

★作用及可能之副作用均請參考以上表格★建議依醫囑指示服用

商品名	GalvusMET 高糖優美	TRAJENTA Duo 糖倍平	JanuMet 捷糖穩
成分、含量	Vildagliptin 50mg /Metformin 500mg	Linagliptin 2.5mg/ Metformin 850mg	Sitagliptin 50mg/ Metformin 500mg
外觀			

★注意事項

1. 請認識自己吃的降血糖藥，並照醫師指示服藥，遵從醫囑定期抽血，不可任意調整劑量或停藥。
2. 服藥期間若發生低血糖症狀（饑餓、發抖、冒冷汗），應立即服用 120c.c.果汁或 15 公克糖，若症狀仍未改善，請立即回診。
3. 若有檢查或治療需禁食，請洽醫師或藥師詢問是否停用降血糖藥物。
4. 口服降血糖藥物屬於高警訊藥物可能造成低血糖風險，應儲存於陰涼處，並避免兒童拿取