

正確使用支氣管擴張劑 (MDI 劑型)藥物



生效日期：104/11/09
檢閱日期：108/08/08

修正日期：108/08/08
編號：T-Adult-173



支氣管擴張劑(MDI 劑型)吸入劑的成份及適應症？

支氣管擴張劑(MDI 劑型)吸入劑適用於兒童與成人阻塞性呼吸道疾病之治療，如氣喘、急慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病、肺氣腫等，其成份包括吸入性長效支氣管擴張劑及皮質類固醇，本院有 50mcg 和 250mcg 兩種劑型，請依醫師指示劑量使用，勿自行調整劑量。



50mcg 劑型



250mcg 劑型



MDI 吸入劑的使用方法：


1. 移除吸入劑的蓋子。



2. 上下搖動吸入劑數次，並確定連接處是否緊密。



3. 將輔助器開口較窄的一端，與吸入劑出口連接。



4. 先用力吐一口氣。
5. 再將輔助器的一端開口含在口中，之後按壓吸入劑，並開始持續深吸氣至少 2 秒。
6. 移開輔助器，閉上嘴巴並閉氣約 5~10 秒後，正常呼吸。間隔 30~60 秒後，重複 4-6 步驟一次。
7. 移除輔助器，蓋回吸入劑蓋子，請以清水漱口且將水吐出。
8. 至少一星期清洗輔助器一次，以水清洗後直接晾乾即可。



9. 吸入劑吸嘴亦可定期(每週)清潔，用乾布將吸嘴內的藥粉擦拭乾淨即可，不要用水清洗。



注意事項：

1. 餘量顯示：可利用吸入劑的劑量計數器來判斷餘量，當計數視窗顯示 105 時，表示還有 105 次劑量。當計數視窗顯示 000 時，表示吸入劑內的藥已用完，需更換新的吸入劑。



2. 藥品保存方式：請將藥物存放在室溫下陰涼處避免陽光照射的地方。



3. 忘記用藥怎麼辦？當您想起來之後，儘快使用所忘記的藥量。如果接近下次用藥時間，不要一次使用兩倍的藥量。請直接省略一次劑量，根據原來應該用藥的時間，使用下一次的劑量。



中山醫學大學附設醫院-護理部
♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥
諮詢電話：
大慶院區 04-24739595 轉分機_____
中興院區 04-22621652 轉分機_____

