

Afatinib(Giotrif, 妥復克膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療肺癌。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
腹瀉(常見)	多喝水，補充電解質
皮膚乾癢或紅疹	避免直接接觸陽光，到戶外時，要戴帽，穿著長袖上衣和長褲，使用可以同時阻擋 A 和 B 紫外線並含有至少 30 防曬係數 (SPF) 的防曬霜。可給予保濕乳液，如果症狀嚴重需告知醫生
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。

- 嘴唇乾燥。
- 青春痘。
- 流鼻血。流鼻涕。
- 改變皮膚或指甲。
- 這種藥物常會引起腹瀉，嘔吐，胃部不適和飢餓感減輕



Pharmacy Department

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- **有腎臟問題的跡象**，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。
- 呼吸急促，體重增加過多或手臂或腿部腫脹。
- 感到疲倦或虛弱。
- 心跳不正常。
- 視力改變，眼痛或極度刺激的眼睛。
- 排尿時疼痛。
- 手掌或腳底發紅或發炎。
- 非常嚴重的腹痛。
- 如果您有**肝臟問題**的跡象，例如胃部不適，大便色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃，請立即聯絡醫生。
- 如果您有肺部或**呼吸問題**，例如呼吸困難，呼吸急促，咳嗽或發燒，請立即聯絡醫生。
- 如果您有皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮的跡象（發燒或不發燒），請立即尋求醫療幫助。

使用這個藥物後應該注意的事項

- **空腹服用**此藥。飯前至少 1 小時或飯後至少 2 小時。
- 避免佩戴隱形眼鏡
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**