

Aflibercept (Zaltrap, 柔癌捕 注射劑)

用於治療癌症。用於治療大腸癌。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

- 頭痛。
- 胃痛或腹瀉。
- 體重減輕。
- 感到疲倦或虛弱。
- 飢餓感消失。
- 口腔發炎或口腔潰瘍。
- 聲音改變。
- 膚色改變。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。；麻疹；皮膚產生發紅、腫脹、起泡或脫皮。有可能伴隨發燒。胸部、喉嚨發生緊縮的感覺；呼吸困難，吞嚥困難、說話困難。聲音異常嘶啞，嘴、臉、嘴唇、舌頭、喉嚨出現腫脹。
- 出現**體液與電解質問題**的跡象，例如情緒變化、精神錯亂、肌肉疼痛或無力、心跳不正常、頭暈或昏倒、心跳加快、口渴、癲癇發作、感到非常疲倦或虛弱、無法排尿液或產生的尿量發生變化、口乾、眼睛乾燥、非常嚴重腸胃不適或嘔吐。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等、發冷、非常嚴重咽喉痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、痰多或痰液變色、解尿時疼痛、口瘡(嘴破)或傷口無法癒合。
- 血壓升高或降低的跡象，例如嚴重的頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 身體一側無力、說話或思考困難、平衡失調、產生一側面部下垂、視力模糊。
- 腿部或手臂發生腫脹、發熱、麻木、顏色變化或疼痛。
- 胸部疼痛或感到壓力。
- 呼吸急促。
- 手掌或腳底發紅或發炎。



- 該藥物可能發生後可逆性腦病綜合徵（PRES）。如果您有感到困惑、警覺性降低、視力改變、視力喪失、癲癇發作或非常嚴重頭痛的跡象、請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 您可能有更多機會被感染，請養成經常洗手的習慣。遠離感染，感冒或流感的人。
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀。
- 如果發生腹瀉或嘔吐，請。
- 按照醫生的指示檢查血液。
- 在接受治療期間，最好進行避孕