

Alectinib(Alecensa, 安立適膠囊)

用於治療癌症。用於治療肺癌

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
腹瀉	多喝水，補充電解質
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
皮膚可能比平時更容易曬傷。	避免直接接觸陽光，到戶外時，要戴帽，穿著長袖上衣和長褲，使用可以同時阻擋 A 和 B 紫外線並含有至少 30 防曬係數 (SPF) 的防曬霜。在未接觸陽光前三十分鐘，使用充足份量。每兩小時和游泳後重複使用一次。如果皮膚反應持續或惡化，請打電話給您的醫生

- 便秘。
- 胃部不適或嘔吐。
- 頭痛。
- 腹瀉。
- 背痛。
- 體重增加。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 出現肝臟問題的跡象，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- 出現肺部或呼吸問題的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒。
- 有腎臟問題的跡象，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。

- **高血糖的跡象**，如口渴，更餓，頻尿，潮紅，呼吸加快或聞起來像水果。
- 心跳緩慢。
- 頭暈或昏倒。
- 肌肉疼痛或無力。
- 腫脹。
- 視力改變。
- 感到非常疲倦或虛弱。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您的血糖較高（糖尿病），則需要密切注意血糖。
- 如果您是男性，請在治療期間以及最後一次服藥後的3個月內進行**避孕措施**
- 如果在服藥後嘔吐，請勿重複服藥。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**