

Asparaginase(Leunase, 樂拿舒注射劑)

用於治療癌症。用於治療一種白血病。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果該藥物之前引起過流血，或胰臟問題

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西

- 胃痛或腹瀉。
- 胃部不適或嘔吐。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 胰腺問題（胰腺炎）的跡象，例如非常嚴重的胃痛或嘔吐。
- 高血糖的跡象，如口渴，更餓，頻尿，潮紅，呼吸加快或聞起來像水果。
- 身體一側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊。



- 頭痛。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 發燒。
- 如果您發現有血胸痛，咳血；氣促；腿部或手臂腫脹；吞嚥困難。請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您的血糖較高（糖尿病），請諮詢您的醫生。這種藥物可能會**增加血糖**。
- 請**避免**喝酒，以免影響肝功能
- 在接受治療期間，最好**進行**避孕

