

Atezolizumab (Tecentriq, 癌自禦注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對該藥物過敏。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用。

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
在接受治療之後，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 胃部不適或嘔吐。胃痛。
- 便秘。
- 背部，骨骼，關節，肌肉或頸部疼痛。
- 頭痛。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 出現肺部或呼吸問題的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難
- 胰腺問題（胰腺炎）的跡象，例如非常嚴重的胃痛
- 神經系統問題的跡象，例如情緒或行為改變，感到困惑，發燒，手或腳麻木或刺痛
- 心臟問題的跡象，例如胸痛，心跳加快，心跳不正常或呼吸急促
- 皮膚反應，如皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮（有或沒有發燒）
- 尿路感染（UTI）的徵兆，例如血尿，解尿時疼痛，下胃痛或骨盆痛。



使用這個藥物後應該注意的事項

- 按照醫生的指示檢查血糖
- 有些人在輸液過程中有副作用。注意是否有背部或頸部疼痛，發抖，頭暈，昏倒，發燒，臉潮紅，搔癢，皮疹，呼吸急促，或面部腫脹。
- 該藥常會引起腹瀉。如果大便帶血，請立即聯絡醫生。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

