

## Bevacizumab (Avastin, 癌思停 注射劑)

用於治療癌症。

### 使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。  
未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您患有高血壓。
- 如果您最近有出血

### 使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
腹瀉	多喝水，補充電解質
出現輕微流血現象,如流鼻血等	用拇指和食指捏著鼻孔，或緊按著流血的鼻孔 10 分鐘。止鼻血後最少 12 小時內不能擤鼻子

- 頭痛
- 感到頭暈，疲倦或虛弱。
- 背部，肌肉或關節疼痛。
- 頸部疼痛。
- 皮膚乾燥。
- 指甲改變。
- 味覺異常。
- 改變聲音。
- 流鼻涕或鼻塞。
- 睡眠困難。
- 眼淚變多。



### 使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **高血壓的跡象**，例如非常頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- **高血糖的跡象**，如意識混亂，困倦，口渴，更餓，頻尿
- 身體一側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊。
- 呼吸急促，體重增加過多或手臂或腿部腫脹。
- 嚴重的便秘或胃痛。這些可能是嚴重腸病的跡象。
- 多汗。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 焦慮
- 手掌或腳底發紅或發炎。
- 如果有任何**出血問題**的跡象（例如瘀傷、牙齦出血、尿中有血、吐血或吐出看起來像咖啡渣的東西），請立即聯絡醫生。
- 如果您有感到困惑，警覺性降低，視力改變，視力喪失，癲癇發作或非常頭痛的跡象，請立即聯絡醫生。

### 使用這個藥物後應該注意的事項

- 您可能有更多機會被感染。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。
- 該藥物可能會**影響傷口的癒合**，包括手術後的癒合問題
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀
- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉，請諮詢醫生
- 在接受治療期間，至最後一次療程後六個月內，你最好使用**避孕措施**