

Bleomycin(Bleocin,撲類惡)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。

- 改變皮膚或指甲。
- 皮膚刺激。
- 膚色改變。如手，肘和膝蓋等某些部位的皮膚可能會變黑
- 感到疲倦或虛弱。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 出現肝臟問題的跡象，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- 有腎臟問題的跡象，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。
- 胸痛或壓力。



Pharmacy Department



- 咳嗽不會消失。
- 嚴重的口腔刺激。
- 非常嚴重的皮膚刺激。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您有呼吸急促或其他呼吸問題，請立即聯絡醫生。
- 按照醫生的指示檢查肺功能。
- 按照醫生的指示檢查血液。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

