

Bortezomib(Velcade, 萬科靜脈凍晶注射劑)

用於治療癌症。用於治療多發性骨髓瘤。淋巴瘤

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素如 vitamin C）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐(可能持續 24 小時)	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
皮膚癢或紅疹	可給予保濕乳液，如果症狀嚴重需告知醫生
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後 1 至 2 星期，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
有些人手或腳趾會有麻木或刺痛感，在治療結束後會緩慢恢復	處理尖銳，熱或冷的物品時要小心。若情況嚴重需告知醫生。

- 頭暈。
- 胃痛。
- 睡眠困難。
- 頭痛。



使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 出現**肝臟問題**的跡象，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- **血壓高或低的跡象**，例如嚴重的頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 身體一側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 吐血或嘔吐，看起來像咖啡渣。
- 感到非常疲倦或虛弱。
- 如果您有**肺部不適的症狀**，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒，請立即聯絡醫生。
- 如果心跳加快或異常，請立即聯絡醫生。任何暈倒；排尿困難；肌肉無力或抽筋；胃部不適，嘔吐，腹瀉或無法進食；或感到呆滯。
- 如果您有感到困惑，警覺性降低，視力改變，視力喪失，癲癇發作或非常頭痛的跡象，請立即聯絡醫生。
- 告訴醫生您是否患有心臟病。如果您呼吸短促，體重增加過多，心跳不正常或手臂或腿部腫脹，請立即聯絡醫生。
- 如果您感到非常疲倦或虛弱或有瘀傷或出血，尿色深或皮膚或眼睛發黃；皮膚蒼白；尿液通過量的變化；視力改變；一側的力量變化大於另一側，說話或思考困難或平衡變化；或發燒。請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 這種藥物常有便秘，腹瀉，嘔吐和胃部不適。
- 為降低感到頭暈或暈眩的機會，如果您一直坐著或躺著，請緩慢起身。小心上下樓梯。
- 如果您是男性，請在治療期間以及最後一次服藥後至少4個月內執行**避孕措施**。
- 治療期間**避免喝綠茶**，會減少藥品藥效
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**

