

Carboplatin(Carboplatin, 剋鉑停靜脈注射液)

用於治療癌症。用於治療卵巢癌等癌症

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 如果您有出血問題
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
在接受治療之後 2 至 3 星期，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程 6 星期後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後 2 至 3 星期，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程 6 星期後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 便秘，腹瀉，胃痛，胃部不適或嘔吐。
- 落髮。(罕見)

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 出血的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物、尿中有血、牙齦出血、陰道異常出血、瘀傷或流血



Pharmacy Department

- 有腎臟問題的跡象，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。
- 出現肝臟問題的跡象
- 耳鳴，聽力下降或其他任何聽力變化
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感
- 視力喪失。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 這種藥物經常會嘔吐。
- 按照醫生的指示檢查血液。
- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉或飢餓感消失，請諮詢醫生。
- 可能導致男性不育或女性停經
- 在接受治療期間，最好進行避孕

