

Dacarbazine(Dacarbazin, 達卡巴仁注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐(可能持續 12 小時)	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物

- 胃部不適或嘔吐。
- 飢餓感消失。
- 落髮。
- 臉部潮紅。
- 臉部麻木或刺痛。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 出血的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷；或流血

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您有肝臟問題的跡象，例如胃部不適，大便色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃，請立即聯絡醫生。
- 您可能有更多機會被感染。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀。
- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉或飢餓感消失，請諮詢醫生。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

