

Everolimus(Afinitor, 癌伏妥錠)

用於治療癌症。用於治療某些類型的腎囊腫。用於防止器官移植後排斥

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。
未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您有乳糖不耐受症

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
皮膚癢或紅疹	可給予保濕乳液，如果症狀嚴重需告知醫生
腹瀉	多喝水 ，補充電解質
在接受治療之後，您的 血小板會減少 。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的 白血球細胞會減少 。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
接受治療數日之後，可能出現 口腔疼痛或口腔潰瘍 。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次。請不要使用含酒精或碘的漱口水。
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱(常見)	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 青春痘。
- 頭痛。
- 睡眠困難。
- 便秘，腹瀉，胃痛，胃部不適，嘔吐或飢餓感減輕。
- 味覺改變。



- 體重下降。
- 指甲改變。
- 落髮。
- 關節痛。
- 背痛。
- 手臂或腿部疼痛。
- 肌肉痙攣。
- 流鼻血。
- 鼻子或喉嚨發炎。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 胃部不適或嘔吐，或非常不舒服。
- 手掌或腳底發紅或發炎。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 胸痛。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 快速或異常心跳。
- 頭暈或昏倒。
- 癲癇發作。
- 肌肉疼痛或無力。
- 月經（月經）改變。這些可能包括錯過的時間段。
- 情緒變化。
- 腫脹。
- 如果您有**肺部不適的症狀**，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒，請立即聯絡醫生。
- 該藥物可能會影響傷口的癒合。如果您需要進行手術，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 按照醫生的指示檢查血糖。
- 該藥物可能導致高血脂
- 避免吃柚子和柚子汁。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

