

Fluorouracil(5-FU,好復注射液)

用於治療癌症。用於治療大腸癌。乳腺癌。胃癌。胰腺癌。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

| 副作用 | 處理方式 |
|---|--|
| 皮膚可能比平時更容易曬傷。 | 避免直接接觸陽光，到戶外時，要戴帽，穿著長袖上衣和長褲，使用可以同時阻擋 A 和 B 紫外線並含有至少 30 防曬係數 (SPF) 的防曬霜。在未接觸陽光前三十分鐘，使用充足份量。每兩小時和游泳後重複使用一次。如果皮膚反應持續或惡化，請打電話給您的醫生 |
| 注射部位疼痛 | 冰敷 15 分鐘，一天可以數次 |
| 腹瀉 | 多喝水，補充電解質 |
| 接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。 | 進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次 |
| 在接受治療之後 1 至 2 星期，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。 | 完成最後療程 4 星期後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫 |
| 在接受治療之後 1 至 2 星期，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血 | 完成最後療程 4 星期後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。 |
| 食慾不振(在停止使用之後，仍出現這情況) | 在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西 |
| 落髮(可能) | 在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。 |



- 胃部不適或嘔吐。
- 皮膚乾燥。
- 指甲變化。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 胸痛或壓力。
- 呼吸急促，體重增加過多或手臂或腿部腫脹。
- 心跳不正常。
- 頭暈或昏倒。
- 黑色的大便。
- 吐血或嘔吐，看起來像咖啡渣。
- 非常嚴重的腹痛。
- 胃部不適或嘔吐。
- 嚴重腹瀉。
- 嚴重的口腔潰瘍。
- 視力改變。
- 如果光線刺激您的眼睛。
- 手掌或腳底發紅或發炎。
- 腳或手腫脹。
- 感到困惑。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 頭痛。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉或飢餓感消失，請諮詢醫生。
- 如果發生**心臟病**，例如異常心跳。在以前患有心臟病的人中可能更常見。請諮詢醫生。
- 在使用期間，最好使用**避孕措施**