

Gefitinib(Iressa, 艾瑞莎 膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療肺癌。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
腹瀉	多喝水，補充電解質
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西

- 皮膚刺激。
- 青春痘。
- 皮膚乾燥。
- 指甲變化。
- 眼睛乾澀。眼睛刺激。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 視力改變，眼痛或極度刺激的眼睛。
- 非常嚴重的腹痛。
- 胸痛或壓力。
- 咳嗽。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。
- 嚴重腹瀉。
- 如果您有肝臟問題的跡象，例如胃部不適，嘔吐或皮膚或眼睛發黃，請立即聯絡醫生。



- 如果您有皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮的跡象（發燒或不發燒），請立即尋求醫療幫助。
- 如果您有肺部不適的症狀，例如呼吸急促或呼吸困難，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 在服用制酸劑之前，請先諮詢醫生
- 避免喝葡萄柚汁
- 在接受治療期間，最好進行避孕

