

Gemcitabine(Gemzar,健澤注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
在接受治療之後 1 至 2 星期，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程 1 星期後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後 1 至 2 星期，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程 1 星期後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
有時會出現落髮現象。	大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次

- 流感症狀。這些包括頭痛，虛弱，發燒，震動，疼痛，疼痛和出汗。
- 感到困倦。
- 這種藥物常有便秘，腹瀉，嘔吐和胃部不適。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助。

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染**的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- **出血**的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷。
- **高血糖**的跡象，如口渴，更餓，頻尿，潮紅，呼吸加快或聞起來像水果。
- 出現**電解質問題**的跡象，例如情緒變化，精神錯亂，肌肉疼痛或無力，心跳不正常，癲癇發作，飢餓感消失或胃部不適或嘔吐，或非常不舒服。
- 頭暈或昏倒非常嚴重。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 如果您有**肝臟問題**的跡象，例如胃部不適，大便色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃
- 如果您發現 **CLS 的徵兆**，例如尿量的改變；無法排尿；尿中有血；快速或異常的心跳；胸痛或壓迫；頭暈或昏倒；體重增加很大；腫脹；吐血或吐出看起來像咖啡渣的東西；或者您有黑色，柏油色或血腥的大便，請立即告訴您的醫生
- 如果您有感到困惑，警覺性降低，視力改變，視力喪失，癲癇發作或非常頭痛的跡象，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您已經或將要接受放射治療，請諮詢您的醫生。
- 該藥物可能在 2 週內會引起的**肺部問題**。如果呼吸困難，請立即聯絡醫生。
- 在服用期間，最好使用**避孕措施**