Ibrutinib(Imbruvica,億珂膠囊)

用於治療癌症。用於治療白血病和淋巴瘤。治療骨髓移植後的排斥效應。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此**藥物過敏**。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您患有肝病

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用：

副作用	處理方式
在接受治療之後，您的**血小板會減少**。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘• 用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的**白血球細胞會減少**。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉(常見)	**多喝水**，補充電解質
接受治療數日之後，可能出現**口腔疼痛或口腔潰瘍**。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成漱口水，每日漱口數次
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
有些人手或腳趾會有**麻木或刺痛感**，在治療結束後會緩慢恢復	處理尖銳，熱或冷的物品時要小心。若情況嚴重需告知醫生。
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 頭痛。
- 肌肉或關節疼痛。
- 肌肉痙攣。
- 焦慮。
- 感冒的跡象。

- 眼睛乾澀。
- 眼淚變多。
- 睡眠困難。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。；搔癢; 皮膚產生發紅、腫脹、起泡或脫皮。有可能伴隨發燒。
- **感染的跡象**，例如發燒 ，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等。
- 皮膚**感染的跡象**，例如滲血，發熱，腫脹，發紅或疼痛。
- **出血的跡象**，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；瘀傷；或流血。
- **高血壓的跡象**，例如非常頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 呼吸急促，體重增加過多或手臂或腿部腫脹。
- 身體一側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊。
- 視力改變。
- 改變痣的顏色或大小。
- 皮膚腫塊或生長。
- 如果您的心跳加快或異常，胸痛，頭暈或想暈倒，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- **避免喝葡萄柚汁**
- 按照醫生的指示檢查血壓。
- 如果發生腹瀉或嘔吐。需要確保避免脫水和**電解質問題**
- 服藥後若發生嘔吐，請不要重覆服藥
- 若身體狀況允許，請**多喝水**
- 請不要打開膠囊。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**