

Ipilimumab(Yervoy,益伏注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次

- 感到疲倦或虛弱。
- 頭痛
- 睡眠困難。
- 體重減輕。
- 背痛。
- 骨或關節痛。
- 這種藥物常會引起腹瀉，嘔吐，胃部不適

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **腎臟問題**的跡象，例如尿量下降或體重增加。
- 出現肺部或**呼吸問題**的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒。
- **大腦問題**的跡象，例如平衡變化，感到困惑，發燒，記憶力問題，肌肉無力，癲癇發作，脖子僵硬或胃部不適或嘔吐。
- **心臟問題**的跡象，例如胸痛，心跳加快，心跳不正常或呼吸急促。
- **胰腺問題**（胰腺炎）的跡象，例如非常嚴重的胃痛，非常嚴重的胃部不適或嘔吐。
- **高血糖**的跡象，如口渴，更餓，頻尿，潮紅，呼吸加快或聞起來像水果。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 感到非常疲倦或虛弱。
- 手臂或腿腫脹。
- 改變排便習慣。



- 如果您的視力，眼睛疼痛或有任何變化，請立即致電醫生。
- 出現**肝臟問題**的跡象，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- 出現**腸胃問題**的跡象，例如大便帶血；吐血或吐出看起來像咖啡渣的東西；或非常嚴重的胃痛，便秘或腹瀉。
- 甲狀腺或腎上腺問題**的跡象。可能是情緒或行為方式的改變，體重的變化，便秘，頭暈，暈厥，感到寒冷，感到非常疲倦。
- 皮膚反應**的跡象，如皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮（有或沒有發燒）。
- 神經問題**的跡象，例如不正常的灼痛，麻木或刺痛感；或無法移動身體的一部分（癱瘓）

使用這個藥物後應該注意的事項

- 該藥物可能會引起**高血糖**
- 有些人在**輸液過程**中有副作用。告訴您的醫生您是否有背部或頸部疼痛，發抖，頭暈，昏倒，發燒，潮紅，瘙癢，皮疹，呼吸急促，面部腫脹
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**