

## Mitoxantrone(Mitoxantrone,雙羥蔥醌注射液)

用於治療癌症。用於治療前列腺癌、白血病、多發性硬化症

### 使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您患有肝臟疾病

### 使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
在接受治療之後 10 天，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程 3 星期後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
在接受治療之後 10 天，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程 3 星期後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。

- 服用此藥約 24 小時後，體液（尿液）顏色變為藍色或綠色。這是正常現象，無需擔心。

- 服用此藥後約 24 小時，眼白呈藍色。這是正常現象，無需擔心。
- 胃部不適或嘔吐。
- 腹部疼痛。
- 便秘。
- 頭痛。
- 背痛。
- 感冒的跡象。
- 體重下降。

### **使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者**

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 尿路感染 (UTI)** 的徵兆，例如感覺需要經常解尿，發燒，下胃痛或骨盆痛。
- 出血的跡象**，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷
- 有腎臟問題的跡象**，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。
- 皮膚或眼睛發黃。
- 體重減輕很大。
- 感到非常疲倦或虛弱。
- 骨頭疼痛。
- 盜汗。
- 皮膚的顏色變為淡藍色，如嘴唇，指甲床，手指或腳趾上的顏色。

### **使用這個藥物後應該注意的事項**

- 如果您曾經有過**心臟問題**，或者正在使用可能引起**心臟問題**的藥物，請諮詢您的醫生。
- 服用該藥物時需要進行心臟功能檢查。
- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉或飢餓感消失，請諮詢醫生。
- 在接受治療期間，最好使用**避孕措施**