

Obinutuzumab(Gazyva ,癌即瓦注射劑)

用於治療癌症。用於治療一種白血病

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您以前感染過 B 型肝炎,在開始使用這種藥物之前，您將接受 B 型肝炎檢測。服用這種藥物以及停止使用後的幾個月，您需要注意肝炎的徵兆
- 如果您有感染。
- 如果您對此藥物過敏
- 接種任何疫苗之前，請告訴您的醫生。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
腹瀉	多喝水，補充電解質
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 便秘
- 飢餓感消失。
- 鼻子或喉嚨發炎。
- 鼻竇痛。
- 感冒的跡象。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。

- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- **出血的跡象**，看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血、牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷
- **肝臟問題**，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- 頭痛。
- 如果心跳加快或異常，任何暈倒；排尿困難；肌肉無力或抽筋；胃部不適，嘔吐，腹瀉或無法進食。請立即聯絡醫生。
- 如果您有以下跡象，例如精神錯亂，記憶力低落，情緒低落（抑鬱），行為方式改變，說話或思考困難，平衡變化或改變視力。請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您有**心臟問題**，請諮詢您的醫生。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**