

Olaparib(Lynparza, 令癌莎膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療卵巢癌。乳腺癌。胰腺癌

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
皮膚癢或紅疹	可給予保濕乳液，如果症狀嚴重需告知醫生
腹瀉	多喝水，補充電解質
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 頭痛。
- 胃痛或胃灼熱。
- 背部，肌肉或關節疼痛。
- 鼻子或喉嚨發炎。
- 味覺異常。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。
- 感冒的跡象。
- 這種藥物常有便秘，腹瀉，嘔吐和胃部不適。



使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡象或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染**的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- **尿路感染**（UTI）的徵兆，例如尿中有血，排尿時灼痛或疼痛，下胃痛或骨盆痛。
- **出血**的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；瘀傷；或流血。
- 手臂或腿腫脹。
- 如果您有**肺部不適**的症狀，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- **避免喝葡萄柚汁。**
- 即使您感覺良好，也應按照醫生的指示繼續服用該藥物。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**