

Olaratumab(LARTRUVO, 樂除瘤注射劑)

用於治療癌症。用於治療軟組織肉瘤。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

- 落髮。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。
- 胃痛。
- 感到疲倦或虛弱。
- 背部，骨骼，關節或肌肉疼痛。
- 頭痛。
- 焦慮。
- 眼睛乾澀。
- 這種藥物常會引起腹瀉，嘔吐，胃部不適和飢餓感減輕。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 高血糖的跡象，如口渴，更餓，頻尿，潮紅，呼吸加快或聞起來像水果。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 感到非常疲倦或虛弱。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 您可能有更多機會被感染。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀。
- 如果您的血糖較高（糖尿病），則需要密切注意血糖。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

