Pembrolizumab(Keytruda, 吉舒達注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此**藥物過敏**
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您正在服用以下藥物：Lenalidomide, thalidomide

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
在接受治療之後，您的**白血球細胞會減少**。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
血脂異常(包括高膽固醇、高三酸甘油脂)	若有心臟病史，需告知醫生，並定期追蹤

- 這種藥物常有便秘，腹瀉，嘔吐和胃部不適
- 感到疲倦或虛弱。
- 背部，骨骼，關節或肌肉疼痛。
- 飢餓感消失。
- 胃痛。
- 頭痛。
- 體重減輕。
- 落髮。
- 味覺異常。
- 睡眠困難。
- 感冒的跡象。
- 流感樣症狀。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 出現排便問題，例如黑色或大便帶血
- 出現肺部或**呼吸問題**的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難

Pharmacy Department

- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 視力改變，眼痛或極度刺激的眼睛。
- 腺體腫脹。
- 感到非常疲倦或虛弱。
- 頭暈或昏倒。
- 發燒或發冷。
- 臉部潮紅。
- 多汗。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 皮膚上有白色斑點。
- 如果您有皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮的跡象（發燒或不發燒），請立即尋求醫療幫助
- 如果您有平衡變化，感到困惑，發燒，記憶力問題，肌肉無力，癲癇發作，脖子僵硬或胃部不適或嘔吐，請立即聯絡醫生。
- 如果您有**肝臟問題**的跡象，例如大便色淺，嘔吐，皮膚或眼睛發黃，請立即聯絡醫生

使用這個藥物後應該注意的事項

- 按照醫生的指示檢查血糖
- 告訴醫生您是否有**血糖高的徵兆**，例如口渴，更餓，頻尿，呼吸急促或聞起來像水果。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**