Pertuzumab(Perjeta,賀疾妥注射液)

用於治療癌症。用於治療乳腺癌。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此**藥物過敏**
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
接可能出現**口腔疼痛，口腔刺激或口腔潰瘍**。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成漱口水，每日漱口數次
味覺異常。很多人在癌症治療期間都會經歷口味的變化。食物可能沒有味道或口感不同	經常用軟毛牙刷來刷牙和刷舌頭。一天裡要經常用碳酸氫鈉和水漱口 (把 1/4 茶匙碳酸氫鈉與 1 杯水混合)，特別在餐前和餐後
有些人手或腳趾會有**麻木或刺痛感**，在治療結束後會緩慢恢復	處理尖銳，熱或冷的物品時要小心。若情況嚴重需告知醫生。

- 感到頭暈，疲倦或虛弱。
- 頭痛.
- 胃痛或腹瀉。
- 飢餓感消失。
- 皮膚乾燥。
- 搔癢

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒 ，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 胸痛或壓力或心跳加快。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。

- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 如果您有發冷，頭暈，感到疲倦或虛弱，發燒，頭痛，昏倒，皮疹，面部腫脹，呼吸困難，胃部不適或嘔吐或喘息，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 服用這種藥物時，您需要檢查心臟功能。
- 如果您有腳踝或腿部腫脹，心跳不正常，24 小時體重增加超過 2 公斤，請立即聯絡醫生
- 如果您胃部不適，嘔吐，腹瀉或飢餓感消失，請諮詢醫生
- 您可能有更多機會被感染。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**