

## Regorafenib(Stivarga, 瘋瑞格膜衣錠)

用於治療癌症。

### 使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您有以下任何健康問題：高血壓或肝病。

### 使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用：

副作用	處理方式
噁心及嘔吐(大多數人無症狀)	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
高血壓(很快會發生)  在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	請定期量測血壓，並回診追蹤血壓控制  完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成漱口水，每日漱口數次
治療期間可能會發生手足皮膚反應。手掌和腳掌可能會發麻，變紅，發麻，疼痛或腫脹。皮膚也可能變乾或發癢。	避免穿太緊的鞋子，用溫水清洗手和腳，避免熱水，可塗抹一些乳液。外出時使用至少30防曬係數 (SPF) 的防曬乳。情況嚴重請告知醫生
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。

- 頭痛。



Pharmacy Department

- 改變聲音。
- 胃痛。
- 肌肉痙攣。

#### 使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應的跡象**，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。；搔癢；皮膚產生發紅、腫脹、起泡或脫皮。有可能伴隨發燒。
- **出血的跡象**，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；瘀傷；或流血。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等。
- **高血壓的跡象**，例如非常頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- **甲狀腺水平低的跡象**
- **手掌或腳底發紅或發炎。**
- **腹部腫脹。**
- **如果您有胸痛，頭暈，呼吸急促或暈倒，請立即聯絡醫生。**
- **如果您有肝臟問題的跡象**，例如胃部不適，嘔吐或皮膚或眼睛發黃，請立即聯絡醫生。
- **如果您有感到困惑，警覺性降低，視力改變，視力喪失，癲癇發作或非常頭痛的跡象**，請立即聯絡醫生。
- **如果您有皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮的跡象（發燒或不發燒）**，請立即尋求醫療幫助
- **該藥物可能會影響傷口的癒合**。如果您有任何其他傷口問題，請立即聯絡醫生

#### 使用這個藥物後應該注意的事項

- 建議與低脂餐併服。低脂餐必須少於 600 卡路里和少於 30% 的脂肪。
- 避免吃柚子和柚子汁。
- 按照醫生的指示檢查血壓。
- 這種藥物常會引起腹瀉，嘔吐，胃部不適和飢餓感減輕。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

