

Rituximab(Mabthera, 莫須瘤注射劑)

用於治療癌症。用於治療白血病和淋巴瘤等癌症。類風濕關節炎。尋常性天皰瘡

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 如果您患有活動性 B 型肝炎感染
- 如果您最近接種過活疫苗
- 如果您有感染。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
胃部不適或嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
在接受治療之後您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 頭痛。
- 腹瀉。
- 流鼻涕或鼻塞。
- 肌肉痙攣。
- 背部，肌肉或關節疼痛。
- 睡眠困難。
- 盜汗。
- 喉嚨發炎。
- 臉部潮紅。
- 焦慮。



使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 血壓高或低的跡象，例如嚴重的頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 高血糖的跡象
- 頭暈。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您有以下跡象，例如精神錯亂，記憶力低落，情緒低落（抑鬱），行為方式改變，一側的力量變化大於另一側，說話或思考困難，平衡變化或改變視力。請立即致電醫生。
- 在接受治療期間，最好進行避孕

