

Trametinib(Mekinist,麥欣覓膜衣錠)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用：

副作用	處理方式
腹瀉	多喝水，補充電解質
接受治療數日之後，可能出現 口腔疼痛或口腔潰瘍 。口腔潰爛或牙肉出血，可能會造成感染。	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。
高血壓	請定期量測血壓，並回診追蹤血壓控制
噁心及嘔吐(大多數人無症狀)	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物

- 皮膚乾燥。
- 指甲改變。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。；搔癢；皮膚產生發紅、腫脹、起泡或脫皮。有可能伴隨發燒。
- **出血**的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷；或流血止。
- 出現肺部或**呼吸問題**的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒。

- 體液和電解質問題的跡象。
- 高血壓的跡象，例如非常頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 有腎臟問題的跡象，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。。
- 皮膚嚴重反應的跡象，例如皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮（有或沒有發燒）。
- 腺體腫脹。
- 發燒或發冷。
- 如果您有心臟病的跡象，例如咳嗽或呼吸急促，腳踝或腿部腫脹，心跳不正常，24 小時內體重增加超過 2 公斤，請立即聯絡醫生。
- 如果您發現有血液凝集的跡象，例如胸痛，腿部或手臂腫脹或疼痛；或說話或吞嚥困難。請立即聯絡醫生。
- 如果視力模糊，或其他視力改變，請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 該藥皮疹很常見，但其他皮膚反應也可能發生。
- 空腹服用此藥。飯前至少 1 小時或飯後至少 2 小時。
- 按照醫生的指示檢查血壓
- 按照醫生的指示檢查眼壓和視力。
- 在接受治療期間，最好進行避孕