

Trastuzumab(Herceptin, 賀癌平凍晶注射劑)

用於治療癌症。用於治療乳腺癌、胃癌等

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 如果您以前曾服用過 daunorubicin, doxorubicin, epirubicin, idarubicin, or mitoxantrone
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物

- 感到疲倦或虛弱。
- 胃痛。
- 頭痛。
- 體重減輕。
- 味覺異常。
- 背部，骨骼，關節或肌肉疼痛。
- 睡眠困難。
- 感冒的跡象。
- 鼻子或喉嚨發炎。
- 流感樣症狀。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 血壓高或低的跡象，例如嚴重的頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 情緒低落（抑鬱）。





- 如果您有**心臟或肺部問題**的跡象，這包括呼吸困難或呼吸急促，腳踝或腿部腫脹，心跳異常，24 小時內體重增加超過 2 公斤，頭暈等。請立即致電醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 按照醫生的指示檢查血液。
- 在接受治療期間，最好進行**避孕**

