

## Trifluridine/Tipiracil(Lonsurf, 朗斯弗膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療大腸癌。胃癌。

### 使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏。
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。  
未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您患有肝臟疾病

### 使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用：

- 落髮。
- 感到疲倦或虛弱。
- 胃痛。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。
- 口味改變。
- 這種藥物常會引起腹瀉，嘔吐，胃部不適和飢餓感減輕。

### 使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。；搔癢；皮膚產生發紅、腫脹、起泡或脫皮。有可能伴隨發燒。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等。
- 出血的跡象，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷；或流血。

### 使用這個藥物後應該注意的事項

- 您可能有更多機會被感染。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀。
- 與食物一起服用
- 如果在服藥後嘔吐，請勿重複服藥
- 在接受治療期間，最好進行避孕

