

## Vemurafenib(Zelboraf, 日沛樂膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療某種類型的皮膚癌。

### 使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。  
未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您有以下任何健康問題：低鈣，低鎂或低鉀。
- 如果您的**心電圖 QT 較長**。

### 使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
腹瀉	<b>多喝水</b> ，補充電解質
食慾不振	在癌症治療期間，你需要吃得足夠才會有充足的體力，盡量經常進食，吃你喜歡的食物，嘗試每隔 2 小時吃點東西
落髮	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。
有些人手或腳趾會有 <b>麻木或刺痛感</b> ，在治療結束後會緩慢恢復	處理尖銳，熱或冷的物品時要小心。若情況嚴重需告知醫生。
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
<b>皮膚乾癢或紅疹</b>	可給予保濕乳液，如果症狀嚴重需告知醫生

- 背部，肌肉或關節疼痛。
- 頭痛。
- 胃部不適或嘔吐。
- 味覺改變。
- 咳嗽。

### 使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在**服藥**時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡

像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 出現**肝臟問題**的跡象，例如胃部不適，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
- 有**腎臟問題**的跡象，例如無法排尿、血尿、忽然尿量異常增多、體重忽然變很重。
- 頭暈或昏倒。
- 快速或異常心跳。
- 手臂或腿腫脹。
- 手掌或腳底發紅，發炎，疼痛或皮膚較厚。
- 視力改變，眼痛或極度刺激的眼睛。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 檢查皮膚是否有變化，例如新的疣，皮膚酸痛或紅腫或出血或無法癒合，或者痣的顏色或大小發生變化。
- 如果您有皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮的跡象（發燒或不發燒），請立即尋求醫療幫助。

#### **使用這個藥物後應該注意的事項**

- 您可能更容易被曬傷。避免陽光，日光燈和日光浴床。使用防曬霜，並穿上可保護您免受陽光照射的衣服和眼鏡。
- 該藥物可能會導致某種類型的異常心跳（延長 QT 間隔）
- 如果在服藥後嘔吐，請勿重複服藥。
- 這種藥物可能使手指向內彎曲。如果發生這種情況，請立即聯絡您的醫生。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**