

Venetoclax(Venclexta, 唯可來膜衣錠)

用於治療癌症。用於治療白血病和淋巴瘤。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
在接受治療之後，您的血小板會減少。您可能會較平常更容易出現瘀血或出血	完成最後療程後，通常會回復正常。請注意嘗試避免受傷造成瘀傷，避免造成便秘。用柔軟牙刷輕柔地清潔牙齒，因為您的牙肉會較容易出血。保持口腔衛生。
在接受治療之後，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器

- 感冒的跡象。
- 頭痛。
- 睡眠困難。
- 口腔刺激或口腔潰瘍。
- 背部，肌肉或關節疼痛。
- 便秘。
- 胃痛。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- 過敏反應的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- 感染的跡象，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- 血壓高或低的跡象，例如嚴重的頭痛或頭暈，昏倒或視力改變。

- 感到非常疲倦或虛弱。
- 皮膚蒼白。
- 任何無法解釋的瘀傷或出血。
- 腫脹。
- 呼吸急促。
- 渾濁或粉紅色的尿液。
- 尿液顏色變深或皮膚或眼睛發黃。
- 如果心跳加快或異常，任何暈倒；排尿困難；肌肉無力或抽筋；胃部不適，嘔吐，腹瀉或無法進食。請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 如果您的血糖較高（糖尿病），則需要密切注意血糖。
- 避免喝葡萄柚汁。
- 服用這種藥物時，若身體狀況允許，請多喝水
- 如果在服藥後嘔吐，請勿重複服藥
- 在接受治療期間，最好進行避孕