

手術前建議暫停之藥品及天數

(停藥時間與手術大小、出血及停藥栓塞風險相關)

預防血管栓塞/抗血小板藥物				
藥品 (學名/商品名 中文名)	手術前停用 discontinue	何時恢復使用 restart		
Acetylsalicylic acid / Aspirin [®] 阿斯匹林 腸溶衣錠 Acetylsalicylic acid / Bokey [®] 伯基 膠囊	7 -10 天	經手術醫師確認，術後24hr可恢復使用		
Clopidogrel / Plavix [®] 保栓通 膜衣錠	7 -10 天			
Ticagrelor / Brilinta [®] 百無凝 膜衣錠	5 天			
Prasugrel / Eient [®] 抑凝安 膜衣錠	7-10 天			
預防血管栓塞/抗凝血藥物				
Edoxaban / Lixiana [®] 里先安 膜衣錠 Rivaroxaban /Xarelto [®] 拜瑞妥 膜衣錠 Apixaban /Eliquis [®] 艾必克凝 膜衣錠	腎功能 (mL/min/1.73m ²)	≥60	2天	經手術醫師確認，術後24hr可恢復使用
		30-59	3天	
Dabigatran /Pradaxa [®] 普栓達膠囊	腎功能 (mL/min/1.73m ²)	≥ 50	2-3天	
		<50	3-5天	
Warfarin /Cofarin [®] 可化凝錠	INR 值	>2	5天以上	
		≤ 2	4天	
末梢血管循環障礙藥物				
Cilostazol /Pletaal [®] 普達錠			1-2天	經手術醫師確認，術後24hr可恢復使用
Dipyridamole [®] 待匹力達糖衣錠				
Ginkgocentrates [®] 杏銀膜衣錠				
非西藥類(中草藥及膳食補充劑)				
出血風險	當歸、黃耆、魚油、亞麻籽油、葡萄籽萃取物、維生素E、軟骨素、生薑		2週	術後遵醫囑
	大蒜、人蔘		1週	
低血糖風險、肝臟毒性、影響麻醉鎮靜藥效、心血管功能不穩定、鈉水滯留	葡萄糖胺、麻黃、卡瓦胡椒(kava)、貫葉連翹、甘草		1-5天	
	紫錐花(肝毒性)、纈草(延長鎮靜效果)		2週	

參考資料：

UpToDate、藥品仿單、手術全期之用藥安全、NEJM2013;368:2113-2124、2015 Interventional Pain ASRA guidelines、JAMA.2001;286:208-216、JACC 2017 Periprocedural Anticoagulation Pathway

更新日期 109.02 藥劑科



出血風險

手術或檢查出血風險評估

Minor微

- 內視鏡 (純檢查)
- 牙科手術
 - 拔牙 (1-3顆)
 - 牙周手術
 - 植牙
 - 切除膿瘍
- 眼科手術
 - 白內障手術
 - 青光眼手術
- 表淺手術
 - 膿瘍切除
 - 範圍小的皮膚切片

Low低

- 內視鏡 (有切片)
- 攝護腺或膀胱切片
- 心律不整病人的電生理檢查
- 右側上心室心律不整的經導管電燒手術
- 非冠狀動脈的血管攝影
- 節律器(pacemaker)或去顫器(ICD)置放手術

High高

- 複雜性內視鏡 (切息肉)
- 脊髓麻醉、硬脊膜外麻醉、腰椎穿刺
- 胸腔手術
- 腹腔手術
- 骨科大手術
- 肝臟切片
- 腎臟切片
- 經尿道前列腺切除術
- 體外震波碎石術