

目錄

【口腔癌核心測量指標】	1
【大腸直腸癌核心測量指標】	3
【肝癌核心測量指標】	5
【肺癌核心測量指標】	7
【乳癌核心測量指標】	8
【子宮頸癌核心測量指標】	9
【攝護腺癌核心測量指標】	11
【膀胱癌核心測量指標】	12
【食道癌核心測量指標】	13
【胃癌核心測量指標】	14

【口腔癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
治療 01	手術病理報告是否有紀錄手術邊緣的比例	97.0% (97/100)	-
治療 02	手術病理報告有 ECS 侵犯的比例	100.0% (68/68)	-
治療 1A (2012 年新增)	口腔癌腫瘤接受頸部淋巴腺切除手術而確定有轉移的人，任何一處頸部淋巴腺莢膜有侵犯情形(ECS) 的比率	-	37.5% (9/24)
治療 1B (2012 年新增)	口腔癌腫瘤接受頸部淋巴腺切除手術而確定有轉移的人，所有頸部淋巴腺莢膜都沒有侵犯情形的比率	-	62.5% (15/24)
治療 1C (2012 年新增)	口腔癌腫瘤接受頸部淋巴腺切除手術而確定有轉移的人，報告中沒記載淋巴腺莢膜侵犯情形(ECS)或是其他原因不適用的比率	-	0.0% (0/24)
治療 09	手術病理報告有 LVI 侵犯的比例	100.0% (19/19)	-
治療 03	淋巴結清除有描述陽性淋巴結所在位置的比率	50.0% (34/68)	-
治療 04	放射治療時有電腦斷層定位，電腦斷層定位之日期須在放射治療日期當天或前一天的比例	86.7% (52/60)	-
治療 2A (2012 年新增)	口腔癌病人手術後接受輔助性放射治療劑量 ≤ 60 Gy，於 7 週(含)內完成治療的比率	-	0.0% (0/0)
治療 2B (2012 年新增)	口腔癌病人手術後接受輔助性放射治療劑量 > 60 Gy 但 ≤ 70 Gy，於 8 週(含)內完成治療的比率	-	82.5% (33/40)
治療 05	放射治療前 2 個月有牙科會診	93.3% (56/60)	-
治療 03 (2012 年新增)	口腔癌病人做放射治療前 2 個月曾做牙科會診的比率	-	98.4% (62/63)
治療 06	手術後 6 週(42 天)內者有放射線治療	73.7% (28/38)	-
治療 04 (2012 年新增)	口腔癌病人手術後 6 週內開始放射治療的比率	-	62.5% (25/40)
治療 07	術後有放射線治療因有 ECS and 手術邊緣陽性,又有化學治療的比例	78.6% (11/14)	-
治療 05 (2012 年新增)	口腔癌病人頸部淋巴腺有轉移且有淋巴腺莢膜侵犯情形(ECS)接受同步化學治療及放射治療(CCRT)的比率	-	55.6% (5/9)
治療 08	首次原發手術後 30 天內死亡者的比例	2.0%	-

指標代碼	指標名稱	2011 年 (2/100)	2012 年
治療 06 (2012 年新增)	口腔癌病人手術後 30 天內死亡的比率	-	1.5% (2/133)
治療 7A (2012 年新增)	口腔癌病人開始接受放射治療(不含化療)後 90 天內死亡的比率	-	0.0% (0/14)
治療 7B (2012 年新增)	口腔癌病人開始接受同步化學治療及放射治療後 90 天內死亡的比率	-	0.0% (0/43)
追蹤 1A	口腔癌病人治療後第 1 年，回診至少 4 次的比率	90.1% (73/81)	-
追蹤 01 (2012 年新增)	接受治療的口腔癌病人，治療結束後 1 年內回核心科別追蹤至少 ≥ 4 次的比率(個案 Class 1 及 2 者)	-	95.7% (111/116)

【大腸直腸癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
治療前-1	大腸直腸癌病人手術前在病歷上有至少接受包括「胸部x光」及「腹部超音波或CT scan 或MRI」的百分比	93.8% (90/96)	-
2012 年公告 治療前-1A	大腸癌病人手術前在病歷上有至少接受包括「胸部x光」及「腹部超音波或CT scan 或MRI」的百分比	-	98.0% (96/98)
治療前-1B	直腸癌(Rectum Ca)病人治療前在病歷上紀錄有接受包括「胸部x光」及「腹部超音波或CT scan 或MRI」的比率	-	93.8% (15/16)
治療-1	接受大腸直腸癌切除術之病人，至少於術前6個月或術後6個月內，於病歷上記載曾接受全大腸檢查（大腸鏡檢或直腸鏡檢加下消化道銀劑攝影）。	86.5% (83/96)	79.0% (90/114)
治療-2	Malignant polyp若有下列A.B.C.D之一，於病理報告後6週內接受廣泛性切除術（wide surgical resection）之百分比 A.大腸鏡檢報告指出息肉未完全被切除 B.手術切除外緣之癌細胞呈陽性 C.癌細胞已侵犯淋巴或靜脈組織 D.病理顯示為第3級或屬分化不全之癌細胞	-	0.0% (0/0)
治療-3a 2012 年公告 改治療-3	被診斷為大腸癌病理期別1-3期且尚未轉移的病人，必須在病理診斷後六個禮拜內(至該醫院就醫之日起算)提供治癒性切除（curative resection）。（註：a排除轉院的病人）	95.4% (62/65)	98.0% (48/49)
治療-3b	被診斷為大腸癌病理期別1-3期且尚未轉移的病人，必須在病理診斷後六個禮拜內(至該醫院就醫之日起算)提供治癒性切除（curative resection）。（註：b納入轉院的病人）	93.2% (68/73)	2012 年公告 刪除
治療-4	大腸直腸癌1~3期有手術病人，在組織病理報告中載明手術邊界及淋巴結侵犯情形（包括手術邊界、淋巴結數、淋巴結被侵犯數）之比例。	100% (71/71)	2012 年公 告刪除
治療-5	病理期別第1-3期大腸直腸癌病人，手術邊界為陰性之百分比	100% (71/71)	2012 年公 告刪除
治療-6 2012 年公告 改治療-4	大腸直腸癌病人接受手術後，病理報告至少呈現T、N期別之百分比	90.6% (87/96)	100% (114/114)
治療-7 2012 年公告 改治療-5A	病理期別第1-3期大腸直腸癌手術病人，淋巴結病理檢查12顆以上百分比	95.7% (66/69)	97.3% (73/75)

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
治療 5B	病理期別第I-III期直腸癌(Rectum Ca)手術病人，淋巴結病理檢查 12 顆以上的比率	-	87.5% (7/8)
治療-8	病理報告是否有依據CAP (College of American pathology) 或 類似的check list 做check。	100% (71/71)	2012 年公 告刪除
治療-9 2012 年公告 改治療-6	大腸癌病理期別第三期病人，術後6 週內接受化學治療之百分比	52.2% (12/23)	58.3% (21/36)
治療-10 2012 年公告 改治療-7	第二、三期 (臨床期別為主) 直腸癌病人，6 週內開始治療 (手 術或放療或CCRT) 的百分比	100% (7/7)	90.9% (10/11)
治療-11 2012 年公告 改治療-8	第二、三期直接做化療及放療(CCRT)直腸癌病人，CCRT 算起， 16週內開完刀的百分比	100% (2/2)	83.3% (5/6)
追蹤(1)	第一、二、三期大腸直腸癌病患，在完成所有治療後，在六個月 內接受醫師檢查之比率	98.6% (70/71)	2012 年公 告刪除
追蹤(3) 2012 年公告 改追蹤-2	只經過polypectomy治療之惡性息肉病人，在polypectomy治療 後12個月內接受大腸鏡檢查之比率	83.3% (10/12)	62.1% (18/29)

【肝癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2010 年	2011 年	2012 年
診斷 01 (99 修)	所有肝癌病患中符合共識診斷標準個案的比率	100% (87/87)	100% (104/104)	100% (107/107)
術後療效 評估 01 (99 修)	所有治療後 (curative、 TAE、 其他治療) 的肝癌病人 · 2 個月內追蹤影像學 (echo, CT, MRI) 的比率	-	79.2% (57/72)	88.7% (63/71)
術後療效 評估 02 (99 修)	所有治療前 AFP>20ng/ml 的肝癌病人 · 治療後 (curative、 TAE、 其他治療) 2 個月內追蹤 AFP 的個案的比率	-	81.2% (30/37)	91.9% (34/37)
術 後 追 蹤 01 (99 修)	所有治療後 (curative、 TAE、 其他治療) 的肝癌病人 1 年內追蹤影像學 (echo, CT, MRI) 3 次或以上的比率	-	82.9% (39/47)	86.3% (44/51)
術 後 追 蹤 02 (99 修)	所有治療前 AFP>20ng/ml 的肝癌病人 · 治療後 (curative、 TAE、 其他治療) 1 年內追蹤 AFP 3 次或以上的比率	-	91.3% (21/23)	96% (24/25)
診斷-1 (2012 新增)	所有肝癌病患中符合共識診斷標準個案的比率	-	-	100% (107/107)
診斷-2 (2012 新增)	肝癌個案經細胞與病理診斷之比率。	-	-	30.8% (33/107)
診斷-3 (2012 新增)	肝癌個案有註記 TNM 臨床分期個案之比率。	-	-	100% (107/107)
治療-1	極早期和早期肝癌病人接受治癒性療法的比率。	-	60% (21/35)	58.8% (20/34)
治療-2 (2012 新增)	BCLC stage0 及 A 患者接受 TA(C)E 之比率。	-	-	35.3% (12/34)
治療-3 (2012 新增)	肝癌患者接受手術切除其邊緣無殘留癌細胞之比率。	-	-	96.2% (25/26)
治療-4 (2012 新增)	BCLC stage 0+A 肝癌病患接受放射治療的比率。	-	-	0% (0/34)
治療後 療效評估-1	所有治療後 (curative、 TAE、 其他治療) 的肝癌病人 · 2 個月內追蹤影像學 (echo, CT, MRI) 的比率。	-	-	88.7% (63/71)
治療後	所有治療前 AFP>20ng/ml 的肝癌病人 · 治療後	-	-	91.9%

指標代碼	指標名稱	2010 年	2011 年	2012 年
療效評估-2	(curative、TAE、其他治療) 2 個月內追蹤 AFP 的個案的比率。			(34/37)
治療後追蹤-1	所有治療後 (curative、TAE、其他治療) 的肝癌病人 1 年內追蹤影像學 (echo, CT, MRI) 3 次或以上的比率。	-	-	86.3% (44/51)
治療後追蹤-2	所有治療前 AFP>20ng/ml 的肝癌病人，治療後 (curative、TAE、其他治療) 1 年內追蹤 AFP 3 次或以上的比率。	-	-	96% (24/25)

【肺癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
診斷-1	肺癌病人中有組織細胞學或病理學診斷的比率。	100% (94/94)	99.1% (108/109)
診斷-2	非小細胞肺癌病人組織細胞學或病理學無法再細分的比率 (NSCLC-NOS%)。	2.2% (2/91)	1.1% (1/94)
治療-1	臨床第 I-II 期非小細胞肺癌病患進行腫瘤原發部位手術切除的比率。	90% (9/10)	84.6% (11/13)
治療-2	有進行腫瘤原發部位手術的臨床第 I-II 期非小細胞肺癌病患進行腫瘤完全切除性手術(包含肺葉切除 Lobectomy 或全肺切除 Pneumonectomy)的比率。	88.9% (8/9)	100% (11/11)
治療-3	有進行腫瘤原發部位手術的臨床第 I-II 期非小細胞肺癌病患完成原發部位同側縱膈腔淋巴結取樣或摘除至少 3 個位置以上(N2 stations)的比率。	33.3% (3/9)	90.9% (10/11)
治療-4	臨床第 I-II 期非小細胞肺癌病患未進行腫瘤原發部位手術，而以其其他方式治療(包括放射線治療、化學治療、標靶治療，或 ablation therapy)的比率。	0% (0/1)	100% (2/2)
治療-5	臨床第 IIIA 期非小細胞肺癌病患首次治療為直接腫瘤完全切除性手術(包含肺葉切除 Lobectomy 或全肺切除 Pneumonectomy)的比率。	22.2% (2/9)	40% (2/5)
治療-6	有進行腫瘤原發部位手術的臨床第 IIIA 期之非小細胞肺癌病患進行腫瘤完全切除性手術(包含肺葉切除 Lobectomy 或全肺切除 Pneumo-nectomy)的比率。	50% (1/2)	50% (1/2)
治療-7	有進行腫瘤原發部位手術的臨床第 IIIA 期非小細胞肺癌病患完成原發部位同側縱膈腔淋巴結取樣或摘除至少 3 個位置以上(N2 stations)的比率。	50% (1/2)	0% (0/2)
治療-8	臨床第 IIIA 期非小細胞肺癌病患未進行腫瘤原發部位手術，而以其其他方式治療(包括放射線治療、化學治療、標靶治療，或 ablation therapy)的比率。	57.1% (4/7)	100% (3/3)
治療-9	術後被證實切除邊緣仍存有癌細胞的非小細胞肺癌病患，在術後 8 週內有進行放射線治療的比率。	0% (0/0)	0% (0/0)
治療-10	未進行腫瘤原發部位手術，且身體活動功能良好(ECOG PS 得分是 0 或 1)的臨床第 III 期非小細胞肺癌病人，有做合併性化學治療與放射線治療的比率。	33.3% (2/6)	25% (2/8)

【乳癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2010 年	2011 年	2012 年
治療前(1)	45 歲以上(含)乳癌婦女施行首次治療前 3 個月內有乳房 x 光攝影的比率。	-	89% (56/63)	95.5% (62/65)
治療前(2)	乳癌病人在術前曾經細胞學或組織學診斷的人數 (排除：轉移性乳癌與同一天病人)	82.8% (53/64)	90% (69/77)	98.8% (81/82)
治療(1)	第零期且病理報告接受清除腋下淋巴結數 10 顆以下的病人數		100% (4/4)	-
治療(1) (2012 年修)	乳癌第零期*沒有進行標準腋下淋巴結擴清式的比率。	-	-	100% (6/6)
治療(2)	乳癌第 I 期執行乳房保留手術的比率。	59.1% (13/22)	69% (20/29)	72% (18/25)
治療(3)	乳癌病人手術後病理檢查報告記錄原發腫瘤大小的比率。	100% (55/55)	100% (78/78)	100% (82/82)
治療(4)	侵犯性乳癌在切除腫瘤時，病理檢查 10 個或以上的腋下淋巴結廓清的比率。	-	73.2% (30/41)	90% (18/20)
治療(5)	病理分期為侵犯性乳癌，有 ER 接受體報告的比率。	-	100% (78/78)	100% (82/82)
治療(6)	病理分期為侵犯性乳癌，有 PR 接受體報告的比率。	-	100% (78/78)	100% (82/82)
治療(7)	病理分期為侵犯性乳癌，有 Her2 接受體報告的比率。	-	100% (78/78)	100% (82/82)
治療(8)	侵犯性乳癌接受乳房保留手術後放射線治療的人數	73.1% (19/26)	83.3% (25/30)	80% (28/35)
治療(9)	更年期前婦女，腋下淋巴結陽性的乳癌病人給予輔助性化學治療的比率	-	92.9% (13/14)	90.9% (10/11)
治療(10)	更年期後婦女腋下淋巴結陽性的乳癌病人給予賀爾蒙治療或輔助性化學治療的比率。	-	89.5% (17/19)	95% (19/20)
治療(11) (2012 年修)	侵犯性乳癌病人，ER 接受體陽性(+)給予賀爾蒙治療的比率	-	-	100% (49/49)
治療(12) (2012 年修)	第 1、2 期乳癌以手術為首次治療，施行哨兵淋巴結取樣術之比率	-	-	87.8% (43/49)
治療(13) (2012 年修)	淋巴感染 4 顆以上乳房全切除有進行放射治療的比率	-	-	37.5% (3/8)

【子宮頸癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011年	2012年
前趨病灶-1	子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3的個案，在確定診斷時曾接受陰道鏡檢查的比率。	52.5% (62/118)	-
前趨病灶-2	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3之個案，於6個月內已接受適當處置的比率。	100% (118/118)	-
前趨病灶-3	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3之個案，於1年內未接受適當處置的比率。	0% (0/118)	-
前趨病灶-4	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3且接受治療之個案中，接受子宮全切除手術所占的比率。	39.0% (46/118)	-
前趨病灶-5	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3之50歲(含)以上個案，進行子宮頸錐狀手術時，同時接受子宮內頸搔刮取樣(ECC)人數的比率。	52.4% (22/42)	-
前趨病灶-6	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3之個案且以子宮頸錐狀手術為完整治療後，於6個月內抹片追蹤的比率。	51.9% (40/77)	-
前趨病灶-7	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3且以子宮全切除手術為完整治療後之個案，於6個月內抹片追蹤的比率。	48.9% (22/45)	-
前趨病灶-8	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN2-3，且接受子宮全切除手術之個案中，術前曾接受子宮頸錐狀手術所占的比率。	60% (27/45)	-
前趨病灶-1 (2012新增)	診斷性子宮頸手術標本之組織病理檢查結果為CIN 2/3(或HSIL), adenocarcinoma in situ或microinvasive carcinoma之50歲(含)以上個案，進行子宮頸錐狀手術時，同時接受子宮內頸取樣(ECC)的比率。	-	64.4% (29/45)
前驅病灶2 (2012新增)	組織病理檢查為CIN2-3或CIS*個案且於本院接受治療者，於180天(含)內接受抹片追蹤的比率。	-	60.7% (74/122)
前驅病灶3 (2012新增)	病理確診為CIN3病人，以子宮頸錐狀手術為完整治療之百分比。	-	90.5% (67/74)
治療-1	原發性子宮頸癌病人以同步化放療 (CCRT) 為主要治療時，病患有接受化療次數至少2次以上的比率。	100% (6/6)	-

指標代碼	指標名稱	2011年	2012年
治療-2	子宮頸癌病人接受體外放射治療，於治療期間有再度確認放療位置的比率。	97.1% (33/34)	-
治療-3	診斷為子宮頸侵襲癌，並於本院接受治療，治療後1年內充分追蹤的比率。	85.4% (41/48)	-
治療-4	非第 IV B期 (FIGO期別) 之子宮頸癌病人3個月內死亡的比率。	5.1% (3/59)	-
治療-6	子宮頸鱗狀上皮細胞癌，接受子宮切除手術 (包括任一型的子宮切除手術及次全子宮切除手術)，於365天內再接受骨盆放射線治療的比率。	36.67% (11/30)	-
治療-1 (2012新增)	FIGO(IIA2, IIA2~IVA)子宮頸癌病人以放療為首次治療時，病人接受同時合併化療的比率。	-	81.3% (13/16)
治療-2 (2012新增)	FIGO期別第I-IVA期子宮頸侵襲癌*治療結束180天(含)內已接受抹片追蹤*的比率。	-	89.2% (33/37)
治療-3 (2012新增)	子宮頸鱗狀上皮細胞癌，接受子宮切除手術(包括任一型的子宮切除手術及次全子宮切除手術)，於180天(含)內再接受骨盆放射線治療的比率	-	21.1% (4/19)
治療-4 (2012新增)	接受手術為首次治療的FIGO期別 IA2或以上的子宮頸癌病人，骨盆腔淋巴結摘除≥12顆的比率。	-	92.9% (13/14)
治療-5 (2012新增)	子宮頸癌患者以放射治療或合併化學及放射治療為首次治療者，於診斷後30天(含)內開始接受治療的比率	-	72.2% (13/18)
治療-6 (2012新增)	子宮頸癌患者以放射或合併化學及放射治療為首次治療者，於63天(含)內完成上述治療的比率。	-	50% (9/18)

【攝護腺癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
診斷-1	新診斷之攝護腺癌病人診斷前有無做肛診檢查	69.1% (29/42)	94.7% (36/38)
診斷-2	新診斷之攝護腺癌病人診斷前有 PSA 值	100% (42/42)	100% (38/38)
診斷-3	經直腸攝護腺切片檢查的取樣數大於或等於 10 條	100% (23/23)	100% (24/24)
診斷-4	診斷時之病理標本有標明病理切片之格里森分數 (Gleason score)	100% (42/42)	92.1% (35/38)
診斷-5	完成臨床期別	100% (42/42)	100% (38/38)
治療-1	侷限性低風險病人以荷爾蒙作為唯一治療方式	0% (0/7)	0% (0/2)
治療-2	臨床期別第三期接受放射線治療時合併使用荷爾蒙治療	0% (0/0)	50% (1/2)
治療-3	攝護腺癌病人接受根治性體外放射線治療，每天劑量介於 1.8-2.2Gy 者，其原發部位劑量不低於 72Gy	100% (15/15)	100% (10/10)
治療-4	未接受荷爾蒙治療之遠端轉移病人接受原發部位 放射線治療	0% (0/0)	0% (0/0)
治療-5	根治性攝護腺切除手術後三個月內因手術併發症 再入院的人數	0% (0/2)	0% (0/1)
追蹤-1	接受根治性攝護腺切除手術後病理期別為 T2 的病人數，手 術後 6 個月內仍可以偵測到 PSA	0% (0/2)	0% (0/0)
追蹤-2	根治性放射線治療後五年內，因放射性直腸炎或膀胱炎需住 院	13.3% (2/15)	0% (0/10)

【膀胱癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
診斷-1	完成臨床期別	100% (37/37)	100% (29/29)
診斷-2	膀胱癌之經尿道腫瘤切除術(transurethral resection of bladder tumor, TURBT)標本有描述並看到固有肌肉層(muscularis propria)	96.9% (31/32)	88% (22/25)
診斷-3	完成病理期別	100% (2/2)	100% (4/4)
診斷-4	病理報告中有描述分化程度	100% (37/37)	100% (29/29)
治療-1	第二、三期(T2-T4aN0M0)之膀胱癌病人，接受放療或膀胱切除手術	28.6% (2/7)	100% (5/5)
治療-2	接受膀胱根治性手術(radical cystectomy)的膀胱癌病人中，病理報告有呈現骨盆腔左右之淋巴結	100% (1/1)	100% (1/1)
治療-3	病理期別 \geq T3 的病人接受全身性化學治療	33.3% (1/3)	66.7% (2/3)
追蹤-1	接受膀胱根治性手術(radical cystectomy)之肌肉侵犯性膀胱癌病人(T2, T3) · 治療後有局部復發的情況	0% (0/1)	0% (0/1)
追蹤-2	接受放射線治療之肌肉侵犯性膀胱癌病人(T2, T3) · 治療後有局部復發的情況	100% (1/1)	0% (0/1)

【食道癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
診斷 01	食道癌病人在接受治療前，有明確細胞學或組織學診斷之比例	93.3% (28/30)	100% (28/28)
診斷 02	食道癌病人有臨床分期且在接受治療前，前曾經接受 PET CT、Chest CT 或 MRI 影像學檢查判定食道癌臨床期別並於病歷記錄之比例	100.0% (30/30)	100% (28/28)
診斷 03	診斷報告判定腫瘤位於頸部，上段或/及中段胸部之食道癌病人，手術前接受支氣管鏡檢查的百分比	85.7% (6/7)	33.3% (1/3)
診斷 04	接受食道黏膜切除術或黏膜下剝離術前曾接受內視鏡超音波檢查的百分比	0.0% (0/0)	0.0% (0/0)
治療 01	接受積極治療前照會營養小組成員百分比	40% (2/5)	61.1% (11/18)
治療 02	食道癌病患經臨床分期診斷判定為可進行手術切除未接受誘導式化療或同步化療直接接受手術的百分比	31.3% (5/16)	7.69% (1/13)
治療 03	臨床分期診斷為可進行手術切除的食道癌病患，然而接受第一線同步化放療	12.5% (2/16)	23.1% (3/13)
治療 04	臨床分期診斷可進行手術切除的食道癌病患，接受第一線同步化放療治療後再接受手術的百分比	25.0% (4/16)	69.2% (9/13)
治療 05	臨床分期診斷可進行手術切除的食道癌病患，直接接受第一線同步化放療治療後再接受手術的百分比	0% (0/0)	0% (0/0)
治療 06	臨床判定為可進行手術切除之食道癌，手術切除標本兩側切除端有顯微殘餘癌細胞或有巨觀殘餘癌細胞之病人接受手術後同步化放療的百分比	50.0% (1/2)	0% (0/1)
治療 07	臨床分期診斷為無法進行手術切除的食道癌病人，接受第一線同步化放療治療的百分比	16.7% (2/12)	9.1% (1/11)
治療 08	臨床分期診斷為無法進行手術切除的食道癌病人，接受第一線同步化放療治療後接受食道切除的百分比	8.3% (1/12)	0% (0/11)
治療 09	臨床分期診斷為轉移性食道癌病患，接受姑息性(palliative)化學治療同步化放療(concurrent chemoradiotherapy, CCRT)或僅接受放射線治療之比例	75.0% (9/12)	81.8% (9/11)
治療 10	臨床判定為可進行手術切除之食道癌，手術切除標本切除端無殘餘細胞的百分比	77.8% (7/9)	50.0% (3/6)
治療 11	臨床判定為可進行手術切除之食道癌未接受誘導式同步化放療即進行手術切除，手術切除標本淋巴結病理檢查 15 顆以上之百分比	0.0% (0/5)	0.0% (0/1)
治療 12	臨床判定為可進行手術切除之食道癌接受同步化放療後再手術切除，手術切除標本淋巴結病理檢查 5 顆以上之百分比	100% (1/1)	50.0% (1/2)
追蹤 01	食道癌病人接受食道切除手術於術後 30 天內死亡之比例	0.0% (0/15)	10.0% (1/10)

【胃癌核心測量指標】

指標代碼	指標名稱	2011 年	2012 年
診斷 1 102 修訂	胃腺癌病人在接受治療前，前曾經以細胞學或組織學診斷之比例	80.6% (25/31)	87.5% (21/24)
診斷 2 102 修訂	胃腺癌病人在接受治療前，有接受胸部(X 光 or CT)及腹部(CT scan or MRI or sono for 早期癌)影像學診斷判定胃腺癌之比例	87.1% (27/31)	95.8% (23/24)
診斷 3 102 刪除	接受胃黏膜切除術或黏膜下剝離數前曾接受內視鏡超音波檢查的百分比	0% (0/0)	0% (0/2)
治療 1 102 修訂	臨床分期為第 I ~ III B 期之胃及食道賁門癌病人，在經內視鏡及病理切片確診後 6 個星期內接受手術的百分比	83.3% (5/6)	90.0% (9/10)
治療 2 102 修訂	臨床分期為第 I ~ III B 期之胃及食道賁門癌病人接受手術切除後，巨觀下完全切除且顯微鏡下手術邊界為陰性的百分比	75.0% (6/8)	66.7% (6/9)
治療 3	臨床或病理分期為 M1 的胃及食道賁門癌病患，接受化學治療的百分比	71.4% (10/14)	40.0% (4/10)
治療 4	接受根治性切除手術之胃及食道賁門癌病人，淋巴結病理檢查 15 顆以上之百分比	100% (7/7)	93.3% (14/15)
追蹤 1 102 修訂	接受胃切除手術的病人於術後 30 天內死亡的百分比	12.0% (3/25)	0% (0/20)
追蹤 2 102 刪除	巨觀下觀察完全切除的胃及食道賁門癌病人，在切除後的 6 個月內接受醫師複查的百分比(分母排除死亡及轉院者)	80.0% (10/12)	93.8% (15/16)
追蹤 3 102 刪除	接受胃切除癌病人，手術後 1 年內曾接受胃鏡檢查的百分比	12.0% (3/25)	35.0% (7/20)
追蹤 4 102 刪除	接受 R0 手術的胃及食道賁門癌病人，手術後 1 年內曾接受胸部 X 光、腹部超音波的百分比	10.0% (1/10)	57.1% (8/14)