



照護用品介紹

中山附醫癌症資源中心 114.09更新



口腔用品

“貝舒膜” 左旋麩醯胺酸口膜片 食品(純素)



成分: L-Glutamine, Maltodextrin, Xanthan gum, Vegetable oil, Guar gum, Wheat protein glycerin, Locust bean gum, Gum arabic

營養標示		
每一份量 本包裝含	0.2 公克 20 份	
	每份	每日參考值百分比
熱量	0.4 大卡	0%
蛋白質	0.03 公克	0%
脂肪	0.02 公克	0%
飽和脂肪	0.01 公克	0%
反式脂肪	0 公克	*
碳水化合物	0.02 公克	0%
糖	0 公克	*
鈉	0 毫克	0%
麩醯胺酸	20 毫克	*

。使用範圍：

- 營養添加劑，限於補充食品中不足之營養素時使用。
- 可單次食用多片，或依需求單次於同位置黏貼多層。

。使用方式：

- ① 清潔雙手，並確保雙手乾燥。
- ② 撕開鋁箔包裝，取出口膜片。
- ③ 將口膜片黏著於口內。
- ④ 黏貼後十分鐘內口內應保持靜止不動 (避免喝水、進食、說話)。

齒博士牙齦膏

Enoxolone Gingival Paste 80g



適應症：第一次使用前須先經過牙科醫師診斷。緩解牙齦紅腫，牙齦發炎、對於齒齦疾病期間的消腫，抗發炎具有緩解效果。

用法用量：如同牙膏使用方式，建議每日2-3次，每次取約1cm，於餐後取本品適量使用軟毛牙刷或手指輕輕按摩牙齦數分鐘，隨後漱口。

1. 使用軟毛牙刷



* 使用“齒博士牙齦膏”刷牙，每天至少3分鐘來清潔口腔。

2. 塗抹方式



* 牙齦發炎、紅腫等口腔症狀問題者，可塗抹患部，待3-5分鐘後漱口。

利口寧藥用牙膏



主要成分：CHLORHEXIDINE GLUCONATE

- 適用狀況：
 - 提升牙周健康，預防牙周病或植體周圍炎。
 - 矯正、植牙、假牙的牙菌斑控制。
 - 清除牙菌斑，治療牙齦炎。
 - 去除口腔內病原體，預防口腔內細菌位移感染。
- 使用方法：早餐後及睡前，使用小頭軟毛牙刷，全口徹底清潔3分鐘(舌苔也要刷乾淨)，再用清水輕漱。如有牙齦炎症狀，可先用牙膏塗抹在牙齦發炎處，留置3分鐘後再刷牙。


醫藥級濃度及配方



不含酒精



不含刺激SLS



不含三氯沙



不含起泡劑



不含防腐劑

樂利口抗炎凝膠



主要成分：CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

詳細介紹:

全新唯一 Chlorhexidine 獨特凝膠劑型，具殺菌、消炎、抗腫及黏膜修復功能。直接塗抹於患部或搭配塑膠彎針使用，施打入牙周囊袋內，效果更佳。

齒博士膜速濕漱口水



適應症：

配合正確刷牙習慣，幫助去除牙菌斑、幫助減少口臭、降低牙周病發生機率、保持口腔健康、口氣清新

使用方法：

1. 使用本品每次 10-20ml 無須加水稀釋，含漱 30 秒後吐掉，無須再用清水漱口。
2. 建議搭配牙齦膏刷牙清潔，維持口腔健康。

安炎寧口內炎漱劑



詳細介紹:

不含酒精及色素，溫和不刺激黏膜及傷口。兼具殺菌抑菌功能，術前術後預防細菌感染。每次15ml，早晚及需要時使用

主要成分：0.12% Chlorhexidine Digluconate

吉優適 口內噴劑(未滅菌)

"GelX" Oral Spray(Non-sterile)



功能：

直接覆蓋保護口腔黏膜，提供良好溼潤之癒合環境。

使用方式

將吉優適口內噴劑之瓶蓋取下，然後裝上噴頭，將噴頭朝向口腔內傷口處噴3下。每天重複3次。每次使用後一小時內請勿進食，以維持最佳效果。

主要成分：

Aqua, Sodium saccharin, PVP, Taurine, Zinc Gluconate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Pullulan, Aroma

漱口妥

Ontocur MucoPads


德國原裝進口


形成薄膜屏障
保持口腔潔淨

改善口腔健康
維持黏膜健康

促進唾液分泌

增加生活品質

抗氧化成分
(高濃度原花青素)



原花青素低聚物
Oligomeric Proanthocyanidin
Complexes(OPCs)
(Vitis Vinifera Extract萃取自釀酒葡萄籽)

鵝絨委陵菜
Silverweed,
Potentilla anserina L.

金盞花
Marigold,
Calendula officinalis L.

鼠尾草葉
Sage, Salvia officinalis L.

薰衣草花
Lavender FLOS

使用方式

- 以150c.c熱開水(100°C)沖泡1包MucoPads®, 浸泡於**玻璃**或**瓷杯**中, 並以杯蓋覆蓋浸泡30分鐘
請勿在使用期間外打開杯蓋, 避免活性成分氧化
- 漱口時以30-40c.c仔細漱口20-30秒, 為達到理想效果, 漱口後15分鐘內請勿進食或喝水
- 根據需求, 在一天內之三餐飯後及睡前使用
- 於當日使用完畢前, 請將MucoPads®留在杯內持續浸泡, 當天最後一次使用完再丟棄即可, 並於晚上將剩餘的飲品用完或丟棄





皮膚用品

舒坦麗凝膠 StrataXRT




適用：
放射性皮膚炎、手足症候群
幫助傷口癒合，可保護皮膚，同時優化傷口修復過程

如何使用”舒坦麗”凝膠敷料？

StrataXRT



1.確保患部或表面傷口為乾淨且乾燥的。
在塗抹前，盡可能輕輕把多餘的滲出物
或組織液拍乾。



2.在患部塗上一層非常薄的StrataXRT，
並等待5-6分鐘乾燥。



3.如果你花了更長的時間來乾燥，代表
你可能使用太多了。這時只需要用乾淨
的紙巾或紗布輕輕去除多餘的部分，讓
乾燥過程繼續進行。



4.乾燥之後，StrataXRT能被防曬霜化
妝品和衣服覆蓋。

舒放療凝膠(未滅菌)



適用：放射治療引起的放射性皮膚炎

- 形成保護膜避免肌膚擦傷、刺激
- 減少表皮水分流失，幫助受傷肌膚緩解乾燥不適
- 幫助肌膚恢復健康

使用方法

放療前3天	放療療程中	放療結束後2周
保護	保護 保濕	修復
每日3次 早、中、晚	每日2次 放療後、晚上	每日3次 早、中、晚

NS-21 肌膚修護霜



用途：

舒緩臉部和身體上不同形態之皮膚包括：

照射後之皮膚保濕修護

日曬後肌膚修護

乾性肌膚調理

用法：

輕輕塗抹於須要滋潤修護的皮膚部位，每天使用三次或視需要可多次使用。初次使用時，在塗抹處若有輕微不適感，此為正常反應，皮膚適應後，不適感會逐漸消失。若持續發生，請停止使用。大人小孩適用本品，不建議使用於嬰幼兒。

芙佩爾放療照護凝膠



用途

保濕，舒緩，沁涼，修護，滋潤。

使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於肌膚。



毛孔·暗沉



乾燥·敏感



曬後·舒緩



雷射·修護



全身·照護



術後·保養

芙佩爾即膚修護乳



用途

保濕修護肌膚，使肌膚留住水份，維持肌膚健康，
平日基礎保養，醫美療程前中後加強保養，
適用於雷射術後/化放療/洗腎全方位照護。

使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於肌膚，適用於全臉全身肌膚。




臉部·鎖水



乾裂·脫屑



敏弱·異位性皮脂



尿毒搔癢



孕婦·妊娠期



尿布疹·幼兒

麗沛爾全效手足修護霜



用途

保濕，抗發紅，腫痛，滋潤，修護手足肌膚。

使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於手足肌膚。



日常·美膚



乾裂·腫脹



指甲·暗沉



陳年老皮厚繭



關節皮膚粗糙



促進修護

晨起和清潔手後



每天早晨起床時和每次清潔手後，或者做完家事洗手後。

沐浴後10分鐘內



每次沐浴後的10分鐘內，把握保養是最關鍵時間。

睡覺前



就寢睡覺前，可以在擦完手足霜後，戴棉手套和穿襪子，加強保養持續效果。

🔔 黃金週期



在化放療狀況前，即可開始保養，延緩或減少皮膚刺激敏感情形出現。

Dr. Dens 博存水性傷口敷料(未滅菌) Bortswen Wound Dressing (Non-Sterile)



- 適應症：本品使用於覆蓋皮膚傷口，可吸收傷口分泌物，提供傷口保護，維持傷口濕潤，避免摩擦、乾燥，幫助傷口癒合。
- 用法用量：每日使用覆蓋傷口 2 - 3 次，提供傷口照護；用量視患部大小而定。



其他用品

上療樣 內服液



【適應症】

改善化學藥物治療之癌症病患的疲勞及食慾不振。

使用說明

- 每日二次，於早晚各 4 c.c. (各一瓶)
- 每瓶以 100 c.c. 溫開水稀釋後服用
- 可與其他藥物一同使用，建議間隔二個小時以上較佳
- 連續服用一個月後，可明顯改善因化療造成之疲勞及食慾不振

※使用上有疑問請洽詢醫師或藥師，或致電客服專線 0800-013-885

保存方式

- 於室溫下避光保存
- 開瓶後如果沒有服用完畢，請蓋回瓶蓋，室溫環境保存即可，並儘速在一週內服用完畢

芙娜爾F.Repair 貝克生醫開口訓練器



放療後併發困擾：



肌肉纖維化，導致僵硬




開口不易，進食困難




開口受限，說話不清楚

開口訓練器 REHABILITATION EXERCISER


01 調整張口幅度



02 輕咬訓練器



03 開口訓練



◎ 建議每天10~15分鐘

- ◆ 操作簡單 輕巧省力
- ◆ 拉伸肌肉 開口順利

自製張口訓練器

