

照護用品介紹

中山附醫癌症資源中心 114.09更新



口腔保健

“貝舒膜” 左旋麩醯胺酸口膜片 食品(純素)



成分: L-Glutamine, Maltodextrin, Xanthan gum, Vegetable oil, Guar gum, Wheat protein glycerin, Locust bean gum, Gum arabic

營養標示		
每份量 本包裝含	0.2 公克 20 份	
	每份	每日參考值百分比
熱量	0.4 大卡	0%
蛋白質	0.03 公克	0%
脂肪	0.02 公克	0%
飽和脂肪	0.01 公克	0%
反式脂肪	0 公克	*
碳水化合物	0.02 公克	0%
糖	0 公克	*
鈉	0 毫克	0%
麩醯胺酸	20 毫克	*

。使用範圍：

- 營養添加劑，限於補充食品中不足之營養素時使用。
- 可單次食用多片，或依需求單次於同位置黏貼多層。

。使用方式：

- ① 清潔雙手，並確保雙手乾燥。
- ② 撕開鋁箔包裝，取出口膜片。
- ③ 將口膜片黏著於口內。
- ④ 黏貼後十分鐘內口內應保持靜止不動 (避免喝水、進食、說話)。

齒博士牙齦膏

Enoxolone Gingival Paste 80g



成份：Enoxolone 1%

適應症：第一次使用前須先經過牙科醫師診斷。緩解牙齦紅腫，牙齦發炎、對於齒齦疾病期間的消腫，抗發炎具有緩解效果。

用法用量：如同牙膏使用方式，建議每日2-3次，每次取約1cm，於餐後取本品適量使用軟毛牙刷或手指輕輕按摩牙齦數分鐘，隨後漱口。

1. 使用軟毛牙刷



* 使用“齒博士牙齦膏”刷牙每天至少3分鐘來清潔口腔。

2. 塗抹方式



* 牙齦發炎、紅腫等口腔症狀問題者，可塗抹患部，待3-5分鐘後漱口。

利口寧藥用牙膏



主要成分：CHLORHEXIDINE GLUCONATE

- 適用狀況：
 - 提升牙周健康，預防牙周病或植體周圍炎。
 - 矯正、植牙、假牙的牙菌斑控制。
 - 清除牙菌斑，治療牙齦炎。
 - 去除口腔內病原體，預防口腔內細菌位移感染。
- 使用方法：早餐後及睡前，使用小頭軟毛牙刷，全口徹底清潔3分鐘(舌苔也要刷乾淨)，再用清水輕漱。如有牙齦炎症狀，可先用牙膏塗抹在牙齦發炎處，留置3分鐘後再刷牙。


醫藥級濃度及配方



不含酒精



不含刺激SLS



不含三氯沙



不含起泡劑



不含防腐劑

樂利口抗炎凝膠



主要成分：CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

詳細介紹:

全新唯一 Chlorhexidine 獨特凝膠劑型，具殺菌、消炎、抗腫及黏膜修復功能。直接塗抹於患部或搭配塑膠彎針使用，施打入牙周囊袋內，效果更佳。

齒博士膜速濕漱口水



適應症：

配合正確刷牙習慣，幫助去除牙菌斑、幫助減少口臭、降低牙周病發生機率、保持口腔健康、口氣清新

使用方法：

1. 使用本品每次 10-20ml 無須加水稀釋，含漱 30 秒後吐掉，無須再用清水漱口。
2. 建議搭配牙齦膏刷牙清潔，維持口腔健康。

安炎寧口內炎漱劑



詳細介紹:

不含酒精及色素，溫和不刺激黏膜及傷口。兼具殺菌抑菌功能，術前術後預防細菌感染。每次15ml，早晚及需要時使用

主要成分：0.12% Chlorhexidine Digluconate

吉優適 口內噴劑(未滅菌)

"GelX" Oral Spray(Non-sterile)



功能：

直接覆蓋保護口腔黏膜，提供良好溼潤之癒合環境。

使用方式

將吉優適口內噴劑之瓶蓋取下，然後裝上噴頭，將噴頭朝向口腔內傷口處噴3下。每天重複3次。每次使用後一小時內請勿進食，以維持最佳效果。

主要成分：

Aqua, Sodium saccharin, PVP, Taurine, Zinc Gluconate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Pullulan, Aroma



皮膚照護

舒坦麗凝膠 StrataXRT




適用：

放射性皮膚炎、手足症候群


幫助傷口癒合，可保護皮膚，同時優化傷口修復過程

如何使用“舒坦麗”凝膠敷料？

StrataXRT



1. 確保患部或表面傷口為乾淨且乾燥的。
在塗抹前，盡可能輕輕把多餘的滲出物
或組織液拍乾。



2. 在患部塗上一層非常薄的StrataXRT，
並等待5-6分鐘乾燥。



3. 如果你花了更長的時間來乾燥，代表
你可能使用太多了。這時只需要用乾淨
的紙巾或紗布輕輕去除多餘的部分，讓
乾燥過程繼續進行。



4. 乾燥之後，StrataXRT能被防曬霜化
妝品和衣服覆蓋。

舒放療凝膠(未滅菌)



適用：放射治療引起的放射性皮膚炎

- 形成保護膜避免肌膚擦傷、刺激
- 減少表皮水分流失，幫助受傷肌膚緩解乾燥不適
- 幫助肌膚恢復健康

使用方法

放療前3天 **保護**

放療療程中 **保護 保濕**

放療結束後2周 **修復**

每日**3**次
早、中、晚

每日**2**次
放療後、晚上

每日**3**次
早、中、晚

NS-21 肌膚修護霜



用途：

舒緩臉部和身體上不同形態之皮膚包括：
照射後之皮膚保濕修護
日曬後肌膚修護
乾性肌膚調理

用法：

輕輕塗抹於須要滋潤修護的皮膚部位，每天使用三次或視需要可多次使用。初次使用時，在塗抹處若有輕微不適感，此為正常反應，皮膚適應後，不適感會逐漸消失。若持續發生，請停止使用。大人小孩適用本品，不建議使用於嬰幼兒。

芙媿爾放療照護凝膠



用途

保濕，舒緩，沁涼，修護，滋潤。

使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於肌膚。



芙媞爾即膚修護乳



用途

保濕修護肌膚，使肌膚留住水份，維持肌膚健康，平日基礎保養，醫美療程前中後加強保養，適用於雷射術後/化放療/洗腎全方位照護。

使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於肌膚，適用於全臉全身肌膚。



臉部·鎖水



乾裂·脫屑



敏弱·異位性皮脂



尿毒搔癢



孕婦·妊娠期



尿布疹·幼兒

麗沛爾全效手足修護霜



用途

保濕，抗發紅，腫痛，滋潤，修護手足肌膚。



使用方法

建議每天早晚使用約2~3次，取適量輕輕塗抹於手足肌膚。

晨起和清潔手後	沐浴後10分鐘內	睡覺前	🔔 黃金週期
			
每天早晨起床時和每次清潔手後，或者做完家事洗手後。	每次沐浴後的10分鐘內，把握保養是最關鍵時間。	就寢睡覺前，可以在擦完手足霜後，戴棉手套和穿襪子，加強保養持續效果。	在化放療狀況前，即可開始保養，延緩或減少皮膚刺激敏感情形出現。

Dr. Dens 博存水性傷口敷料(未滅菌) Bortswen Wound Dressing (Non-Sterile)



- 適應症：本品使用於覆蓋皮膚傷口，可吸收傷口分泌物，提供傷口保護，維持傷口濕潤，避免摩擦、乾燥，幫助傷口癒合。
- 用法用量：每日使用覆蓋傷口 2 - 3 次，提供傷口照護；用量視患部大小而定。




康復用品

芙佩爾 F.Repair 貝克生醫開口訓練器



治療後併發困擾：



肌肉纖維化，導致僵硬




開口不易，進食困難




開口受限，說話不清楚

開口訓練器 REHABILITATION EXERCISER


01 調整張口幅度



02 輕咬訓練器



03 開口訓練



◎ 建議每天10~15分鐘

- ◆ 操作簡單 輕巧省力
- ◆ 拉伸肌肉 開口順利

自製張口訓練器



義乳展示



真/假髮借用

更多款式請至-癌症資源中心-挑選



借用方式：

- 癌症資源中心開放時間皆可入內挑選試戴
- 借用期限為1年（若有延長需求可告知）
- 押金（真髮2000元、假髮1000元），歸還前請確實清潔，若無清潔或假髮損壞（包含造型改變）押金將不予退還或僅部分退還
- 每人借用以一頂為限，以利更多癌友使用
- 無真假髮販售服務

✓ 聯繫方式：

中山附醫 癌症資源中心 (04)2473-9595轉20336

✓ 開放時間：

週一至週五08:00-12:00/13:30-17:30

配戴方式

1. 拿起假髮後面標籤處
(有一排格子、可調鬆緊)
2. 拿起左右兩邊鉤子
3. 由外往內勾入
(限一次勾一格，視自身頭圍大小調整)



配戴時，請對著鏡子

4. 兩手拇指，捏住假髮後面，將頭髮戴上
5. 額頭→往上推，露出眼睛不壓額頭
6. 雙耳→抓住臉頰兩邊內網布，調整至兩邊頭髮高度一樣(注意不要一高一低)

觀看配戴影片→



清洗方式

HOPE 財團法人癌症希望基金會 假髮清洗6步驟

步驟1	梳	步驟2	洗	步驟3	潤
 <p>利用長夾以利分線 假髮分成上、中、下層，用寬梳由髮尾至髮根依層梳順，梳順後可用無齒長夾固定假髮分線。</p> <p>勿 拉扯假髮</p>	 <p>約壓2下量 浸泡10分鐘後洗淨 備冷水(水量蓋過假髮即可)加入洗髮精後拌勻，假髮輕輕對折後放入臉盆。</p> <p>勿 使用溫熱水及搓揉假髮</p>	 <p>約壓3下量 浸泡1分鐘 洗沖後，再備冷水(水量蓋過假髮即可)加入潤髮乳拌勻，假髮對折後放入臉盆。</p> <p>勿 使用溫熱水及搓揉假髮</p>	 <p>沖 用冷水順著髮流，用寬梳邊梳邊清洗乾淨。</p> <p>勿 用強力水柱沖洗</p>	 <p>乾 用毛巾輕壓吸乾水份至不滴水。</p> <p>勿 擰扭或脫水</p>	 <p>順 用寬梳依髮線梳順，陳放於髮架或圓形線上，並置於通風處自然陰乾(除濕機可)。</p> <p>勿 日曬及擠壓變形</p>

觀看清洗影片→



化療帽贈送-每人1頂為限



氣切罩/側背帶贈送-每人1頂為限

