

# 在獲得醫療人員提供完整的資訊以及協助下,產婦住院期間是否要實施親子同室

#### 前言

親子同室是母嬰親善醫療院所推動母乳哺育十大措施之一,親子同室能增加 母親哺餵母乳的次數,提昇母乳哺育率,母親接受衛教機會更多,更熟悉嬰兒 照顧技能;也因母嬰有更多的肌膚接觸,促使新生兒更有安全感,減少嬰兒哭鬧,同 時也因親子互動增加,促進親子間的依附關係<sup>III</sup>。

實施 24 小時親子同室對嬰兒有不少好處,但有部分產婦及家屬感到心理和體力上的負擔,如生產後產婦感覺疲憊、身體不舒適、擔心嬰兒跌落的心理壓力,以及同病房間產婦與嬰兒互相干擾影響作息等等,因此,有些人會選擇將小孩留在嬰兒室由護理人員照顧。

此決策輔助表提供三種產後新生兒的照顧方式選擇,您可以思索自己在意的事情,選擇適合自己的照顧方式。

#### 適用對象 / 適用狀況

孕產婦/健康狀況良好的孕產婦及嬰兒

#### 疾病照護或健康議題簡介

產婦生產後,親子同室能讓媽媽馬上熟悉並參與照顧寶寶,又可以隨時哺餵母乳,但因為生產後,身體的疲憊會使產婦產生種種的心理負擔而對親子同室有所疑慮。

中山附醫SDM小組/婦產科.母嬰親善團隊

## 醫療選項簡介

#### 1. 24 小時親子同室

媽媽全天和新生兒住在同一個病房, 由媽媽或家人來照顧寶寶,護理師 會巡視病房,提供協助。寶寶每天 只有在兒科醫師診察時或洗澡時離 開約1小時。

#### 2. 部份時段親子同室

寶寶白天和媽媽同住一病房,晚上 媽媽需要休息時,將寶寶送到嬰兒 室由護理師照顧。

#### 3. 分離照顧

寶寶在產婦住院期間都留在嬰兒室, 媽媽只在餵奶時至嬰兒室哺餵。





# 您目前比較想要選擇的方式是:



#### 請您勾選 ☑

- □ 24 小時親子同室
- □部份時段親子同室
- □分離照顧

# 請透過以下四個步驟來幫助您做決定

#### 步驟一、選項的比較

\					
選項考量	24 小時親子同室	部份時段親子同室	分離照顧		
優 點	1. 可隨時餵奶,所以能增加母乳的分泌。 2. 依據研究顯示,親哺已來了,親哺是母期間以較大學會學的,與一個學會學會學會。 3. 寶寶,以較時時,與一個學會學會學會學會。 4. 可是一個學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會學會	1. 可以獲得部分。 2. 親子同室室室室室室室室室室室室室室室。 3. 晚上寶」等。 3. 晚上寶」等。 4. 以明明, 4. 以明明, 5. 以明明, 6. 以明明, 6. 以明明, 7. 以明, 7. 以明	1. 除餵奶時間外,媽媽比較不會因小孩在旁哭鬧而干擾休息,較可以得到完整的休息時間。 2. 寶寶在嬰兒室可由專業的護理人員來照顧。		
點 缺	<ol> <li>媽媽仍可休息,但可能因寶寶吵鬧或隨時要餵奶,中斷休息。</li> <li>部分產婦及家屬會會寶大學力,例如房產所別方數學同病房產所不過,數學是與學的人類。</li> <li>過少數學的人類的人類的人類的人類。</li> <li>如今數學的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的</li></ol>	1. 白時室點寶時嬰夜間等人 一時室點寶時嬰夜間等人 一時室點寶時嬰夜間等人 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時是 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時室點寶時嬰子 一時空點 一時一時一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	候嬰兒室護理人員通知 至嬰兒室餵奶。 2. 寶寶想喝奶時,無法即 時得到哺餵,容易哭鬧。		

中山附醫SDM小組/婦產科.母嬰親善團隊

1	1	1	1
			6. 寶寶放在嬰兒室,可能
1			
			有集體感染的風險。

4

## 步驟二、您選擇醫療方式會在意的項目有什麼 ? 以及在意的程度為何?

考量項目	1分	感受程度 				
		<u> </u>				
能隨時親餵寶寶母乳	不在意	不太在意	普通	在意	非常在意	
<b>ル</b>	1	2	3	4	5	
可以降吐拉勰系隐霉	不在意	不太在意	普通	在意	非常在意	
可以隨時接觸到寶寶	1	2	3	4	5	
及早學習照顧新生兒	不想要	不太想要	普通	想要	非常想要	
的相關知識與技巧	1	2	3	4	5	
家人與寶寶有較多相	不喜歡	不太喜歡	普通	喜歡	非常喜歡	
處時間	1	2	3	4	5	
寶寶吵鬧干擾我或同	不能接受	不太能接受	普通	能接受	非常能接受	
室產婦休息	1	2	3	4	5	
右口如的从自时期	非常重視	重視	普通	不太重視	不重視	
有足夠的休息時間	1	2	3	4	5	
4的/有口皮会不经职	非常擔心	擔心	普通	不太擔心	不擔心	
我的傷口痛會不舒服	1	2	3	4	5	

#### 步驟三、您對醫療選項的認知有多少?

1.	親子同室寶寶會較快學會喝母奶。	對	不對	□不確定
2.	親子同室寶寶會和我睡在同一張床上。	對	不對	□不確定
3.	親子同室可以增加媽媽的休息時間。	對	不對	□不確定
4.	分離照顧因寶寶放在嬰兒室,可能有集中感染風險。	一對	□不對	□不確定
5.	分離照顧增加媽媽走路的機會,可能會造成傷口不舒服	。  對	一不對	一不確定

#### 步驟四、您現在確認好醫療方式了嗎?

#### 請您勾選 ☑

- 24 小時親子同室
- □部份時段親子同室
- □ 分離照顧

## 瞭解更多資訊及資源

- 1. 國健署·https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1136&pid=3102
- 2. 衛福部健康九九·http://health99.hpa.gov.tw/educzone/edu\_detail.aspx?CatId=11598

#### 完成以上評估後, 您可以列印及攜帶此份結果與您的醫師討論。

本文件於 106 年完成,製作文件內容僅供參考,各醫院提供之治療方案及程序不盡相同,詳情請與您的主治醫師及醫療團隊討論。

#### 參考文獻

- [1] Feldman-Winter, L. and J.P. Goldsmith, Safe Sleep and Skin-to-Skin Care in the Neonatal Period for Healthy Term Newborns. Pediatrics, 2016. 138(3):e1-12.
- [2] Beake, S., et al., Interventions for women who have a caesarean birth to increase uptake and duration of breastfeeding: A systematic review. Maternal & child nutrition, 2017. 13(4):e12390.
- [3] Chiou, S.T., et al., Early skin-to-skin contact, rooming-in, and breastfeeding: a comparison of the 2004 and 2011 National Surveys in Taiwan. Birth, 2014. 41(1): 33-8.





本文宣品經費由國民健康署運用菸品健康福利捐支應 廣告

中山附醫SDM小組/婦產科.母嬰親善團隊



# 中山醫學大學附設醫院 醫病共享決策輔助評估表

# 最後,請花一點時間幫我們完成下列評估 您的肯定跟建議,是我們動力

# 醫療決定品質評估

	不同意	不太 同意	普通	同意	非常 同意
1. 在下決定前,幫助我知道每個選項的 優點及缺點	1	2	3	4	5
2. 在下決定前,幫助我辨識想詢問醫生 的問題	1	2	3	4	5
3. 在下決定前,幫助我表達疑慮與想法 且受到醫療人員重視	1	2	3	4	5
4. 在決定治療方式時,了解在意問題的 好處及壞處	1	2	3	4	5
5. 在決定治療方式時,得到足夠的幫助 或建議來作決定	1	2	3	4	5
6. 在決定治療方式時,作了最適合的決 定	1	2	3	4	5
7. 在協助你下決定時,醫療人員的努力 程度	1	2	3	4	5
8. 這樣的醫病溝通方式,能減少我的焦 慮	1	2	3	4	5

9.這份決策輔助工具,是否有哪些描述、圖片、呈現方式或題目,讓您不容易理解或作答?請簡述:

10.是否有想知道且關係到抉擇的問題,但這份決策輔助工具沒有說明?請簡述:

參考:醫策會「病人安全共進計畫成效評估調查問卷(民眾版)」

有建議也歡迎提出