



中山醫學大學附設醫院 口腔醫學門診部 局部麻醉後注意事項

一、兒童：

1. 麻藥消退的時間會因人及其療程而有所差異，一般而言約 30 分鐘至 3 個小時，家長可以詢問是否仍有“怪怪”或“胖胖”的感覺，以藉此判斷。
2. 在麻藥尚未消退之前，請勿給小朋友食物，因咀嚼會造成小朋友無意間咬傷嘴唇或舌頭，造成外傷及麻藥退去後的疼痛。若是期間小朋友口渴或是有一點餓，可以用杯子喝一些冷開水或流質食物。
3. 在麻藥退去之前，小朋友可能因為覺得有麻藥的地方怪怪的，會去吸吮或是用牙齒咬，家長在看到此動作時，一定要制止，或是讓小朋友咬一塊紗布或棉捲預防。
4. 小朋友若不慎咬傷嘴唇或臉頰，請家長保持患部清潔，並塗抹口內膏以利傷口癒合。

二、成人：

1. 麻藥的消退時間會因人及所做療程而有差異，大致上約為 1 至 4 小時。
2. 在麻藥尚未消退之前，請儘量不要吃東西，以防無意間咬傷嘴唇或舌頭。口渴或有飢餓感，可以用杯子喝一些冷開水或流質食物。
3. 若不慎咬傷嘴唇或舌頭等軟組織，可以塗抹口內膏以利傷口癒合。