



中山醫學大學附設醫院 口腔醫學部 固定假牙使用注意事項

1. 在正式固定假牙製作完成之前，因有美觀或保護牙髓，會在已修形好的牙齒上面裝戴臨時假牙、臨時假牙使用期間，由於材質強度較弱，請小心使用，不要咬太堅硬或是太黏的食物，以免造成臨時假牙破損斷裂或鬆脫。若臨時假牙不慎發生破損斷裂或鬆脫時，應取下保存，儘早回門診交由醫師做進一步處理。
2. 治療期間若有任何不適之現象，如牙齒疼痛、搖動、咬合不適或咬到臉頰或舌頭等，請暫時不要使用假牙咀嚼，儘早回診避免牙齒斷裂或情況惡化。
3. 暫時黏合注意事項：
 - A. 固定贗復假牙治療期間，常需要暫黏試用固定假牙，由於暫時黏合劑 強度較弱，有時會造成固定假牙鬆脫，固定假牙暫黏一旦鬆脫一定要取下好好保存，並馬上回診處理，以避免不小心吞食或發生繼發性齲齒。
 - B. 植牙贗復物試戴期間，由於植牙無牙周韌帶來吸收咬合壓力，因此咬合力大過於黏劑強度或螺絲緊度，就會造成植牙假牙鬆脫，要特別小心，一旦植牙贗復物鬆脫一定要馬上回診處理。

4. 永久黏合注意事項：黏合劑通常在黏合後 24 小時才會達到最大強度，因此建議患者在 24 小時內先不要使用剛黏合假牙咀嚼。
5. 固定贗復假牙的保養方式：
 - A. 贗復假牙、植牙及牙齒請照一般之刷牙程序清潔乾淨。
 - B. 牙縫請用牙線或牙間刷清潔乾淨。
 - C. 橋體與支柱牙之間，請用牙線穿引器將牙線穿過，清潔橋體與支柱牙或橋體與牙齦之間的縫隙；若橋體與支柱牙之間牙縫較大，則可用牙間刷來清潔。
6. 贗復後假牙製做完成後，為維持良好的假牙狀態建議至少每六個月要回診檢查。

T2M000-衛教 06
照顧您口腔健康的好朋友
美牙專線：04-24718668