



中山醫學大學附設醫院
Chung Shan Medical University Hospital
牙科全身麻醉術後須知衛教單張

一、 麻醉後可能出現下列身體不適症狀

1. 喉嚨不適：可能因麻醉中為了協助正常呼吸，而置放了氣管內管所致，此現象約2~3天後會改善。
2. 肌肉酸痛：可能因手術時的姿勢固定不動導致：此現象約2~3天會改善。
3. 噁心嘔吐：可能因麻醉用藥關係，若有此情形，請先暫時禁食，包括開水。
4. 頭 暈：可能因麻醉的關係，因此下床前請先坐5分鐘，確定無頭暈情形，且有家屬協助才可下床活動。
5. 躁動不安：可能因麻醉的關係，因此請注意病人安全，待清醒後會改善。
6. 嗜 睡：可能因麻醉的關係，待清醒後會改善。

二、 飲食注意事項

1. 手術後四小時內需禁食，包括開水。
2. 請於 早 午 晚____：____後腸道蠕動正常且無噁心嘔吐情形，可先行喝少量開水，待30分鐘後，若仍無嘔吐或其他不適情形，則可進食軟質或容易消化的食物。
3. 為了預防便秘及改善手術後可能輕微發燒情況，請多喝開水。

三、 其他注意事項

- ☐ 1. 請按時服藥。
- ☐ 2. 依醫師指示時間，按時回來複診。
- ☐ 3. 若發現發燒38度以上不退、傷口有分泌物、裂開或腫脹厲害不適情形，請立刻來院診治。

如有任何有關麻醉問題請與本科聯絡，本科樂意為您解答或服務。

TEL：(04) 2473-9595分機：32530

中山醫學大學附設醫院 麻醉科 啟

T2M000-衛教16

照顧您口腔健康的好朋友

美牙專線：04-24718668