



心臟衰竭治療方式-藥物



臨床心臟衰竭常見藥物

本院心臟衰竭藥物品項如下
(2023/03)

一、血管收縮素轉換酵素抑制劑

此類藥物重點可以減少心臟纖維化進而抑制心臟肥大。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	血樂平 Ceporin	Captopri 25mg/tab	乾咳 高血鉀	孕婦禁用 飯前服用較佳

二、血管收縮素受體阻斷劑

這類藥物可以有效的減低心臟衰竭引起的死亡與再住院率。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
 圖半刻表：952	可悅您 Cozzar	Losartan 50mg/tab	背痛 咳嗽	上呼吸道感染 監測血壓
 DX/DX ; NVR	得安穩 Diovan	Valsartan 160mg/tab	頭暈 低血壓	肌肝酸上升 姿態性低血壓

參考資料：

- 1.2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure
- 2.2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

三、利尿劑

利尿劑主要是幫助腎臟排除體內鹽份與多餘的水分，減少心臟負擔。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	來適泄 Lasix	Furosemide 40mg/tab	低血鉀 耳毒性	磺胺類 藥物過敏者 需注意
	安立壓 Amizide	Hydrochlorothiazide 50mg amiloride 5mg/tab	男性女乳症 性功能失調	低血壓
	愛達信 Aldactin	Spironolactone 25mg/tab	男性女乳症 性功能失調	經期改變 注意血鉀濃度
	迎甦心 Inspra	Eplerenone 50mg/tab	高血鉀	避免與葡萄柚 一起服用

四、心臟節率抑制劑：

降低心跳減少心臟的負擔，如果出現心跳小於50下，請立即停藥並就醫。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	康立來 Coralan	Ivabradine 5mg/tab	心跳過緩 視力模糊	避免與葡萄柚汁 一起使用

五、貝他阻斷劑：

此類藥物抑制過度活化的交感神經，減緩心跳與血壓，進而減少心肌耗氧量。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	康肯 Concor	Bisoprolol 1.25mg/tab	頭痛、鼻炎 上呼吸道感染 腹瀉	疲倦感 頭暈
	百適歐 Biso	Bisoprolol 5mg/tab		
	心全 Syntrend	Carvedilol 6.25mg/tab	低血壓 高血糖 心跳變慢 體重增加	疲倦感 男性性功能 障礙
		Carvedilol 25mg/tab		
	耐比洛 Nebilet	Nebivolol 5mg	頭痛 暈眩	嗜睡

六、中性溶酶抑制劑－血管收縮素受體阻斷劑：

此類藥物作用為增加體內心臟收縮力與排尿降壓的B型利納利尿胜肽。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	健心安 Entresto	Sacubitril 49mg Valsartan 51mg	低血壓 高血鉀	停用ACEI 36小時 才可服用

七、毛地黃(俗稱強心劑)：

增加心臟的收縮力，降低心跳速率，減輕心臟衰竭的症狀。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	隆我心 Lanoxin	Digoxin 0.25mg/tab	噁心 嘔吐	低血鉀 腹瀉

八、第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑：

此類藥物原本是治療糖尿病藥物，但後來發現可以減少心臟衰竭病人的住院與死亡率，最近更是發現有保護腎臟的效果。

圖片	商品名	學名 / 劑量	副作用	注意事項
	福適佳 Forxiga	Dapagliflozin 10mg/tab	生殖泌尿道 感染	低血壓
	恩排糖 Jardiance	Empagliflozin 10mg/tab	生殖泌尿道 感染	低血壓
	可拿糖 Canaglu	Canagliflozin 100mg/tab	生殖泌尿道 感染	低血壓

第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑在排糖的同時鈉離子與額外的水分也會經由尿液排出，因此也會有降低血壓以及減重的效果。本院尚有其他復方藥物組合：糖順平膜衣錠、控糖穩膜衣錠、恩美糖膜衣錠。

