

淋巴攝影(肢體)

(Lymphosintigraphy)

中山醫學大學附設醫院 核子醫學科

為什麼要做檢查？

主要適應症包括：(一) 淋巴瘤輔助診斷；(二) 惡性腫瘤淋巴轉移的診斷；(三) 先天性或寄生蟲病所致淋巴系嚴重梗阻的診斷。

檢查步驟：

1. 不需禁食；但建議先用清水將腳洗乾淨，以便打針。
2. 依放射師指示脫去鞋襪後平躺於檢查床上。
3. 檢查時，醫師會在您的雙腳大腳指及第二腳指間的部位進行皮內注射核醫示蹤劑(^{99m}Tc phytate)。[若檢查部位不同，注射位置可能不同]
4. 注射後立即進行造影，依個人淋巴流速不同，造影時間亦有不同。通常需時由30分鐘至2小時不等。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。
5. 部分受檢者為了確定病灶，可能加做局部掃描或增加掃描的次數，敬請配合。

注意事項：

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。
2. 檢查注射部位位於腳趾間或手指間之皮下處，由於皮下注射較為疼痛，請多見諒；在攝影的過程中應保持靜止不動。
3. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：足鍊)；其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
4. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處(一公尺以內稱近

距離)。

5. 核醫檢查所用藥物均由國外進口，價格昂貴且具時效性，如有原因無法受檢時，請務必至少提前一個工作天通知我們，電話：04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您