

陰囊攝影

(Scrotal imaging)

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 核子醫學科

為什麼要做檢查？

經過臨床醫師的評估，懷疑或確認您可能有陰囊內睪丸、附睪及血流變化，用於診斷睪丸扭轉、附睪炎、血流阻塞或創傷等急症。

檢查步驟：

1. 檢查前 無須禁食或特殊準備，可照常進食、飲水與服藥。
2. 注射放射性示蹤劑：由醫師在手臂靜脈注射 99mTcO_4^- （過錳酸鹽）。
3. 等待分佈：注射後等待約數秒鐘，讓藥物分佈至陰囊血流後照影。
4. 您將平躺於 γ 相機檢查床上，陰囊置於柔軟墊上。
5. 掃描時間約 20 - 30 分鐘，過程無痛。

注意事項：

1. 接受核醫陰囊攝影掃描時，在攝影過程應保持靜止不動，如此可避免影像模糊。
2. 其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。
3. 核醫檢查所用藥物均由國外進口，價格昂貴且具時效性，如有原因無法受檢時，請務必至少提前一個工作天通知我們，電話：04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您