

核醫 分流/腹膜腔/胸膜腔掃描

(Shunt/peritoneal/pleural scan)

中山醫學大學附設醫院 核子醫學科

為什麼要做檢查：

此檢查主要為分流管通暢檢查(Shunt patency study)，目的為評估管路是否通暢，確認管路阻塞、滲漏點。

檢查準備：

1. 檢查前並不需特別的準備，不需禁食。
2. 造影前請將身體之金屬物品移除或取下，以避免影響影像結果。

檢查流程：

1. 護理師會對檢查處局部進行毛髮剃除。
2. 無菌消毒後，由醫師進行皮下核醫示蹤劑 ($^{99m}\text{Tc DTPA}$) 注射。
3. 注射後立即執行造影(約15分鐘)，視個別情況放射師會於後續不定時與您約定時間進行追蹤造影(每次造影時間約5分鐘)。
4. 攝影時請平躺於檢查台上並保持身體不動，確保影像清晰。
5. 必要時會請您下台走動或按摩腹部。

注意事項：

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行此項檢查，請務必先告知我們。
2. 此檢查罕見有過敏等副作用。
3. 檢查結束後可正常生活，惟因藥物具有微量的放射性，檢查後24小時應盡量避免與嬰幼兒或孕婦長時間近距離(1公尺內)接觸；藥物物理半衰期為6小時，檢查後請多喝水加速輻射藥物排出即可。
4. 核醫檢查所用藥物均由國外進口，價格昂貴且具時效性，如有原因無法受檢時，請務必至少提前一個工作天通知我們，電話：04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您