

奧攝敏斷層掃描造影

Axumin PET Scan

中山醫學大學附設醫院 核子醫學科

為什麼要做檢查？

本檢查可幫助醫師先前接受攝護腺癌治療後，因血中攝護腺特異抗原(PSA)濃度上升，懷疑攝護腺癌復發然而做一般檢查時又沒有發現明確的病灶時，此時執行奧攝敏正子造影能有效找出復發位置及大小，進而針對復發腫瘤進行治療，提高患者存活率。

檢查步驟：

1. 於櫃台報到後不再上廁所。
2. 由醫護人員測量血糖及血壓等生理監測，評估是否適合執行檢查。
3. 由醫護人員為您打上靜脈留置針，並上檢查台做檢查。
4. 於檢查檯上從靜脈留置針注射藥物便馬上做檢查，檢查時間約15~20分鐘期間請保持身體靜止不動。

注意事項：

1. 檢查前至少 4 小時不能進食並盡可能不飲水。
2. 注射藥物前 40~60 分鐘前先解尿，並於注射藥物前 30 分鐘後到檢查結束前都不再解尿。
3. 請攜帶健保卡，檢查過程約 2~4 小時，視情況增減，可攜帶少量食物，檢查做完後即可進食。
4. 檢查前一天請避免劇烈運動，以免造成影像異常影響檢查結果。
5. 檢查前若有無法靜躺 30 分鐘以上者，請事先告知工作人員。
6. 檢查藥物有微量放射性，當日與幼童及孕婦保持適當距離，多飲水幫助解尿排出放射性藥物。

7. 一般慢性病藥物可依照醫囑照常服用。
 8. 檢查前需更衣，勿攜帶貴重物品或無法去除之金屬飾品。
 9. 此藥物較罕有過敏等副作用，請安心使用。
 10. 核醫檢查所用藥物均由國外進口，價格昂貴且具時效性，如有原因無法受檢時，請務必至少提前一個工作天通知我們。
- 電話：04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您