

核醫釷 90 放射栓塞肝腫瘤治療

第二階段評估作業

Y-90 Radioembolization Therapy(2)

中山醫學大學附設醫院 核子醫學科

為什麼要做檢查：

Y-90 微球放射治療分為兩階段，第二階段為術後評估；在 Y-90 注射完畢後，利用加碼攝影機進行造影，確定 Y-90 的位置分布。

檢查前準備：

1. 受檢者須配合醫學影像部血管攝影之檢查注意事項。
2. 若有其他影像醫學科檢查或需洗腎之患者，請事先告知排檢人員。
3. 造影前請將身體之金屬物品移除或取下，以避免影響影像結果。

檢查流程：

1. 於醫學影像部血管攝影室進行動脈注射放射性藥物(Y-90)後隨即至核醫科進行檢查。
2. 平躺於檢查台上，檢查時間約40-60分鐘，視情況需求而有所不同。
3. 造影過程中盡量保持身體不動，避免影響影像的判讀。

注意事項：

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行此項檢查，請務必先告知我們。
2. 治療後數小時內可能會有發燒或噁心的現象，隨著時間或透過服用緩解藥物可改善；2周內可能會有胃口不佳或疲倦感。
3. 治療結束24小時內若能自行下床如廁，請將衛生紙丟入馬桶並沖水兩次；如是包裹尿布者，請將尿布丟入核醫科專用感染性垃圾袋集中。
4. 治療後3天內，請患者與他人盡量保持2公尺以上距離。
5. 治療後1週內，不要與他人共乘兩小時以上之交通工具，且不可與伴侶同床共寢，以及與孕婦或小孩有親密接觸。
6. 核醫檢查所用藥物均由國外進口，價格昂貴且具時效性，如有原因無法受檢時，請務必至少提前一個工作天通知我們，電話：04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您